

**UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DEN CADMIUM - UND BLEIGEHALT
IM ZAHNSTEIN
BEI BEWOHNERN DES GEBIETS
UM DEN HOHENPEISSENBERG**

MICHAEL LANGSEDER

1987





Digitized by the Internet Archive
in 2026



Aus der
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
(Vorstand: Professor Dr. E. SONNABEND)
der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
der Universität München

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN CADMIUM- UND BLEIGEHALT
IM ZAHNSTEIN BEI BEWOHNERN DES GEBIETS UM DEN
HOHENPEISSENBERG

Dissertation
zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde
an der Medizinischen Fakultät der
Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von
Michael Langseder
aus
München
1987

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München

Berichterstatter: Professor Dr. E. Sonnabend
Mitberichterstatter: 1. Professor Dr. M. Klingenberg
2. Professor Dr. E. Kraft
Dekan: Professor Dr. W. Spann
Tag der mündlichen Prüfung: 30. 06. 1987

GLIEDERUNG

	Seite
1. <u>Einleitung</u>	1
2. <u>Überblick über Blei und Cadmium</u>	1
2.1. Vorkommen und Verwendung	1
2.2. Emission	2
2.3. Toxizität	2
3. <u>Die Situation im Gebiet um den Hohenpeißenberg 1984</u>	5
4. <u>Literaturübersicht</u>	8
4.1. Möglichkeiten der Messung einer Schwermetallbelastung des Menschen	8
4.2. Mechanismus der Einlagerung von Schwermetallen in den Zahnstein	9
4.3. Bisherige Untersuchungsergebnisse über Zahnstein	10
4.3.1. Blei	10
4.3.2. Cadmium	14
5. <u>Eigene Untersuchungen</u>	17
5.1. Probennahme	17
5.2. Allgemeines über die Atomabsorptionsspektrometrie	18
5.3. Chemische Analyseschritte	18
5.4. Bestimmung von Blei und Cadmium im Atomabsorptions- spektralphotometer	19
5.4.1. Prinzip am Beispiel Blei	19
5.4.2. Eichung	20
5.4.3. Messung	20
6. <u>Kollektivbeschreibung</u>	22
6.1. Probanden	22
6.2. Kontrollgruppe	27
7. <u>Meßergebnisse</u>	28
7.1. Problematik der Nachweisgrenze	28
7.2. Originaldaten "Probanden" und "Kontrollgruppe"	29

	Seite
8. <u>Auswertung</u>	34
8.1. Gesamtkollektiv Hohenpeißenberg	34
8.1.1. Statistik-Tabelle (mit Ausreißern)	34
8.1.2. Histogramm der Altersverteilung	37
8.1.3. Histogramm des Blei- und Cadmiumgehalts (mit Ausreißern)	38
8.1.4. Korrelations-Tabelle (mit Ausreißern)	39
8.1.5. Statistik-Tabelle (ohne Ausreißer)	40
8.1.6. Histogramm des Blei- und Cadmiumgehalts (ohne Ausreißer)	41
8.1.7. Korrelations-Tabelle (ohne Ausreißer)	43
8.2. Kollektiv Hohenpeißenberg und Vergleichskollektiv	43
8.2.1. Statistik-Tabelle "Nichtraucher + Raucher/Probanden" und "Nichtraucher + Raucher/Kontrolle"	43
8.2.2. Korrelations-Tabelle "Kontrollgruppe" und "Probanden"	44
8.2.3. Histogramm "Nichtraucher/Probanden" und "Nichtraucher/ Kontrollgruppe"	44
8.2.4. Histogramm "Raucher/Probanden" und "Raucher/Kontrolle"	48
8.2.5. Histogramm "Nichtraucher/Probanden" und "Raucher/Probanden"	50
8.2.6. Blei-Cadmium-Korrelationsdiagramme	51
8.3. Untergruppen des Kollektivs Hohenpeißenberg	52
9. <u>Literaturvergleich</u>	55
10. <u>Zusammenfassung</u>	56
11. <u>Literaturverzeichnis</u>	58
12. <u>Anhang</u> (Computer-Ausdrucke)	62
12.1. zu Punkt 8.2.3., S. 44 ff.	62
12.2. zu Punkt 8.2.4., S. 48 ff.	63
12.3. zu Punkt 8.2.5., S. 50 ff.	64
12.4. zu Punkt 8.2.5., S. 50 ff. ("Raucher + Nichtraucher/Probanden" ohne Ausreißer)	65
12.5. zu Punkt 8.3., S. 52 ff.	67
12.6. zu Punkt 8.1.4., 7., S. 40	77

Konzentrationsangaben

Die in Feststoffen enthaltenen Partikel werden in [ppm] oder [$\mu\text{g/g}$] angegeben, wobei $1 \text{ ppm} = 1 \mu\text{g/g}$ gilt.

Die in Flüssigkeiten enthaltenen Partikel werden in [$\mu\text{g}/100 \text{ ml}$] oder in [mg/l] angegeben.

Anmerkung zur Zitierweise

Die Zahlen hinter den Fußnoten beziehen sich auf die im Literaturverzeichnis aufgeführten Werke. Nach diesem Quellenhinweis folgt die Angabe der Seitenzahl in dem zitierten Werk.

1. Einleitung

Blei und Cadmium sind giftig. Mensch und Umwelt werden häufig untersucht, damit eine Belastung mit diesen Schwermetallen aufgedeckt werden kann.

Im Gebiet um den Hohenpeißenberg in Süddeutschland war 1984 über eine Umweltverschmutzung, vor allem mit Cadmium, diskutiert worden. Diese Arbeit soll Werte für eine Beurteilung der Lage erbringen.

2. Überblick über Blei und Cadmium

2.1. Vorkommen und Verwendung

Blei kommt in Form von Erzen vor. Wichtigstes ist der Bleiglanz, Galenit (PbS). Gewonnen wird Blei durch Röstprozesse. Der Anteil der Bundesrepublik an der Weltbergwerksproduktion von Blei betrug 1980 knapp 0,9 % (1).

Blei wird verwendet für Bleifarben, säurefeste Behälter, Dacheindeckungen, Kabelmäntel, als Elektrodenmaterial in Bleiakkumulatoren, für Bleigeschosse, Buchdrucklettern, als Strahlenschutz (Bleiglas, Gummischürzen) und als Stabilisator in der Kunststoffindustrie (2). In Form von Bleitetraäthyl wird es dem Benzin als Klopfbremse beigemischt, 1 Liter bleihaltiges Benzin darf derzeit in der Bundesrepublik bis zu 150 mg Blei enthalten. Davon wird 70-80 % durch den Auspuff abgegeben, der Rest bleibt im Motor, im Öl und im Auspuffsystem (3).

Cadmium ist mit einem spezifischen Gewicht von 8,64 g/cm³ wie Blei ein Schwermetall. Es tritt zusammen mit Zinkerzen auf, zum Beispiel als Beimengung der Zinkblende (ZnS). Cadmium wird aus Nebenprodukten der Zinkverhüttung gewonnen (4).

(1): 12: S. 5

(2): 14: S. 5

(3): 12: S. 25

(4): 29: S. 22 ff.

Verwendung findet das Metall als Korrosionsschutz von Stahlteilen (Galvanisieren), als gelber bis roter Farbstoff, als Stabilisator in der PVC-Herstellung, als Legierungspartner in Loten und für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren (1).

2.2. Emission

Blei wird als Blei-Halogenverbindung aus Autoabgasen abgegeben. Die dominierenden Emittenten in der Industrie sind die Eisen- und Stahlindustrie, die Kohleverbrennung und Bleihütten (2). Cadmium fällt bei der Stahlproduktion, der Kohleverbrennung und der Zink- und Cadmiumverhüttung an (3).

Luftemission besteht hauptsächlich aus Naßdeposition, das heißt Ablagerung mit dem Regen. Bei Blei beträgt der Trockenstaubniederschlag 30 %, bei Cadmium 15 % der Gesamtd deposition (4).

Für Cadmium liegt die industrielle Luftemission bei 90 Tonnen pro Jahr, die Abwasseremission bei 160 t/a (5), für Blei bei 1345 t/a (Luft) und 260 t/a für Abwasser. Kraftfahrzeuge emittieren über 3000 t/a (6).*)

Nicht berücksichtigt sind hierbei andere Emissionen (zum Beispiel Klärschlamm).

2.3. Toxizität

Oral aufgenommenes Blei wird zu 5 - 10 % resorbiert. Eine resorbierte Menge von 1 g gilt als tödlich. Eingeatmetes Blei wirkt toxischer, da es zu 50 bis 100 % resorbiert wird. Die Lunge resorbiert täglich ungefähr 5 µg, der Magen-Darm-Trakt 15 bis 40 µg. Bleitetraäthyl wirkt giftiger als andere Bleiverbindungen (7).

(1): 28: S. 25 ff.

(2): 12: S. 22 ff.

(3): 24: S. 4

(4): 15: S. 50

(5): 21: S. 2, 29: S. 8

(6): 12: S. 24 f.

(7): 14: S. 43

*) Die Zahlen gelten für das Gebiet der Bundesrepublik 1980/81

Blei zeigt zum Skelettsystem hohe Affinität; 90 - 95 % wird hier als Bleitriphosphat gespeichert. Die biologische Halbwertszeit des Knochenpools beträgt 27 Jahre (1). Zwischen Knochen und Blut werden täglich etwa 7 µg ausgetauscht.

Die Giftigkeit des Bleis liegt zum einen in seinen Auswirkungen auf das hämatopoetische System. Blei beeinträchtigt die Porphyrinsynthese durch die Hemmung mehrerer Enzyme. Das führt zur Bleianämie (2).

Zum anderen sind Auswirkungen des Bleis auf das Nervensystem bekannt. Es treten Störungen des zentralen Nervensystems und peripherer Motoneurone auf. Das Krankheitsbild der chronischen Bleivergiftung zeigt neben den Symptomen der Blutarmut uncharakteristische Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Schwäche, Magenbeschwerden, Schwindel und Kopfschmerzen (3).

Akute Zeichen sind abdominelle Koliken, die sich tag- oder wochenlang wiederholen können. Dabei besteht eine hartnäckige Opstipation. Die Schwächung des Nervensystems ist gekennzeichnet durch bleibedingte Encephalopathie, deren verschiedene Symptome sich in Bewußtlosigkeit, Delirien, Wahn- und Verfolgungsideen und ähnlichem äußern können (4). Spätsymptom ist die Parese des Nervus radialis, wodurch es zur "Fallhand" kommt.

Nach verschiedenen Forschern (zB. NEEDLEMAN) sind relativ niedrige, klinisch nicht manifeste Bleiwerte verantwortlich für eine gestörte psychische Entwicklung und ein Intelligenzdefizit bei Kindern (5).

Diagnostisch wichtig zur Erkennung der Vergiftung

(1): 14: S. 59 ff.

(2): 14: S. 83 ff., 5: S. 949 ff.

(3): 5: S. 949 ff., 14: S. 83, 24: S. 8 f.

(4): siehe (3)

(5): 13, 23

ist der Bleisaum, eine feine bläulich-schwärzliche Linie am Zahnfleischsaum.

Eine tumorauslösende Wirkung des Bleis ist nicht gesichert. Zur Entstehung eines Tumors sind wahrscheinlich mit dem Leben nicht vereinbar hohe Bleikonzentrationen nötig (1).

Die Hauptmenge der Cadmiumaufnahme gelangt über den Magen-Darm-Trakt in den Kreislauf. Bei Rauchern liegt die inhalative Aufnahme höher. Cadmium findet sich vor allem in der Niere, in der Leber und in der Lunge. Diese drei Organe enthalten die Hälfte des Gesamtkörpercadmiums. Als Transportform des Cadmiums kommt ein Komplex mit dem Protein Metallothionein in Frage (2).

Die Ausscheidung von Cadmium erfolgt sehr langsam, Angaben über die biologische Halbwertszeit liegen bei 20 - 30 Jahren (3).

Die akute Cadmiumvergiftung bei Einatmen äußert sich in Entzündungen der Atemwege und Allgemeinerscheinungen wie Kopfschmerzen, Schwäche, Fieber etc. Ein Zusammenhang von Cadmium zu der Kinderkrankheit Pseudo-Krupp wird diskutiert (4). Die akute orale Cadmiumvergiftung bewirkt Erscheinungen im Magen-Darm-Trakt, zum Beispiel blutiges Erbrechen und Durchfall. Die chronische Form der Vergiftung ist ebenfalls gekennzeichnet durch Reizerscheinungen der Atemwege (zum Beispiel Lungenemphysem), Riechverlust kann auftreten. Nierenschäden, Magen-Darm-Erkrankungen, Müdigkeit und Blutarmut sind weitere Symptome (5). Als Sonderform einer chronischen Vergiftung wird die Itai-Itai-Krankheit angesehen, durch schmerzhaftes Veränderung des Skelettsystems mit Spontanfrakturen gekennzeichnet. Sie trat in den Jahren 1940 bis 1965 in Japan auf und betraf fast aus-

(1): 14: S. 112

(2): 28: S. 65, 24: S. 17 ff.

(3): 28: S. 70, 29: S. 14

(4): 21: S. 2

(5): 28: S. 71 ff., 10

schließlich mehrgebärende Frauen in der Menopause (1).

Eine carcinogene Wirkung des Cadmiums gilt als wahrscheinlich. Cadmium fördert Lungenkrebs bei Rauchern, KOLONEL (1976) fand eine Beziehung zwischen Nierenkrebs und der Cadmiumexposition, FRIBERG (1974) konnte mit Cadmium an der Injektionsstelle Sarkome hervorrufen (2).

Die durchschnittliche orale Aufnahme in der Bundesrepublik kann mit 70 bis 80 % des von der Weltgesundheitsorganisation als oberste Grenze (0,4 - 0,5 mg/Woche) angegebenen Werts angesetzt werden (3).

3. Die Situation im Gebiet um den Hohenpeißenberg 1984

Im Frühjahr 1984 (März bis Mai) wurde die Bevölkerung des Pfaffenwinkels (= die Region Peißenberg/Schongau) von Meldungen in den Zeitungen aufgeschreckt, die von einer Verseuchung des Gebietes mit Cadmium schrieben (4). Die erhöhten Cadmiumwerte sollten verantwortlich sein für die Kinderkrankheit Pseudo-Krupp, an der angeblich eine im Vergleich zum Landesdurchschnitt vermehrte Anzahl Kinder erkrankt waren. Der Gedanke einer Luftverschmutzung war durch Untersuchungen des Instituts für Meteorologie und Geophysik der Universität Frankfurt (Prof. Dr. Georgii) unterstützt worden, das erhöhte Werte am Hohenpeißenberg festgestellt hatte. Da diese Untersuchungen schon im Frühjahr 1983 durchgeführt worden waren und es den Anschein gehabt hatte, als wären die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorenthalten worden, entwickelte sich rasch eine wachsende Beunruhigung in der Bevölkerung.

Von einer erhöhten Anzahl an Pseudo-Krupp-Erkrankungen zu sprechen ist problematisch, da dieses Leiden nicht meldepflichtig ist und damit auch keine Statistiken vor-

(1): 28: S. 72

(2): 30: S. 20, 32

(3): 28: S. 62 ff., 29: S. 15

(4): 18: S. 1 f., 19: S. 1 f., 20: S. 1 f., 21: S. 1 ff.,
26: Münchner Teil der Südd. Zeitung, 27: ebenso,
25: S. 2

liegen. Umfragen des Umweltministeriums bei Münchner Kinderkliniken, bei der Kinderklinik Garmisch und der Kinderstation des Starnberger Krankenhauses ergaben, daß keine Häufung an Pseudo-Krupp-Fällen in Peißenberg festzustellen war (1). Außerdem ist der Zusammenhang von Pseudo-Krupp und Cadmium als Auslöser nicht gesichert (siehe Seite 4).

Das Gebiet um den Hohenpeißenberg im Voralpenland ist als ländlich einzustufen, Schongau ist sogar staatlich anerkannter Erholungsort. Daher erregten die Frankfurter Ergebnisse starkes Aufsehen.

Neben der Frankfurter Universität untersuchte im gleichen Zeitraum routinemäßig auch die Kernforschungsanstalt Jülich (Prof. Dr. Nürnberg †, Institut für Angewandte Physikalische Chemie) die Luftverschmutzung auf dem Hohenpeißenberg. Die Kernforschungsanstalt Jülich unterhält in der ganzen Bundesrepublik ein Netz von etwa 20 Meßstationen mit automatischen Niederschlagssammlern (2). Die Jülicher konnten keine erhöhten Cadmiumwerte feststellen.

In Zahlenwerten drücken sich die unterschiedlichen Ergebnisse so aus: Für 1980 und 1981 weist die Kernforschungsanstalt Jülich eine mittlere tägliche Naßdeposition (die, wie erwähnt, den größten Teil der Bodenbelastung von Schwermetallen darstellt) von $0,85 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ aus. Für vergleichbare ländliche Gebiete wird eine mittlere tägliche Naßdeposition von $0,75 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ angegeben. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß die Naßdeposition von der Niederschlagsmenge abhängt. Je größer die Niederschlagsmenge, desto größer wird der Anteil der Naßdeposition am Gesamtniederschlag sein, und desto geringer wird der Trockenstaubniederschlag sein. Da am Hohenpeißenberg die größte Niederschlagsmenge aller Meßstationen

(1): 26: Münchner Teil der Süddeutschen Zeitung

(2): 15: S. 41 ff.

gemessen wird, ist der Wert von $0,85 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ als unbedenklich einzuschätzen (1).

Das Frankfurter Institut gibt mit $4,6 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ einen weit höheren Wert an (Zeitraum September 1979 bis August 1982). Am Meßort Essen/Ruhrgebiet fanden die Frankfurter eine Naßdeposition von $3,3 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ im Zeitraum September 1979 bis August 1981 (zum Vergleich: Die Kernforschungsanstalt Jülich gibt für 1980/1981 einen Wert von $2,3 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ in Essen an) (2).

Das Frankfurter Institut fand also am Hohenpeißenberg einen Cadmiumwert, der ungefähr ein Drittel über dem Wert von Essen lag, wohingegen die Kernforschungsanstalt Jülich die Belastung in Essen fast dreimal höher als auf dem Hohenpeißenberg ausweist.

In der "technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft" (TA-Luft) liegt der Grenzwert für den Staubbiederschlag bei $7,5 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, für landwirtschaftlich genutzte Gebiete bei $2,5 \mu\text{g Cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ (3). Diese TA-Luft existiert seit 1978, es soll 1986 eine neue TA-Luft mit niedrigeren Grenzwerten in Kraft treten.

Nachdem die unterschiedlichen Ergebnisse diskutiert worden waren, kamen bald neue Untersuchungen hinzu, die sich allerdings auf Stichproben beschränkten. Behörden wie das Landesamt für Umweltschutz und das Gesundheitsamt Weilheim ließen Muttermilch, Waldböden, Gras, Klee, Habichtsfedern und eine Rattenleber untersuchen (unter anderem in der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltschutz in Neuherrberg). Die dabei festgestellten Werte liegen zum Teil weit unter den in ländlichen Gegenden üblichen Belastungen (4).

Die "Umweltinitiative Pfaffenwinkel" dagegen fand

(1): 21: S. 2

(2): wie (1)

(3): 29: S. 17

(4): 27: Münchner Teil der Südd. Zeitung, 1, 31

in Bienenhonig aus einem Wald bei Peiting und bei einem Fisch aus der Ammer doppelt bis vierfach so hohe Cadmiumkonzentrationen, "verglichen mit den in Lebensmitteln zulässigen Werten" (1). Ebenso hatte ein Vater die Muttermilch seiner Frau untersuchen lassen und dabei "erschreckend hohe Cadmiumwerte präsentiert bekommen" (2). Es ist nicht bekannt, bei welchen Labors die letztgenannten Proben analysiert wurden.

4. Literaturübersicht

4.1. Möglichkeiten der Messung einer Schwermetallbelastung des Menschen

Die Messung von Schwermetallen wird auf verschiedenste Art und Weise bei einer Vielzahl von Parametern durchgeführt. In der Umwelt beispielsweise kommen Luft, Wasser, Bodenproben, Tierorgane usw. zur Analyse. Will man aber feststellen, wie stark der Mensch belastet ist, muß man den Menschen selbst als Objekt der Untersuchung wählen. Je nachdem, was untersucht wird, kann man die kurz-, mittel- oder langfristige Belastung ermitteln. Die Verteilung von Schwermetallen vom Ort der Resorption in bestimmte Organe geschieht zum Beispiel durch das Blut. Somit kann man durch Blutproben die momentane Belastung an Schwermetallen feststellen.

Neben Blut wurde eine ganze Reihe von Organen, Körperteilen und anderen Parametern untersucht: Urin, Haare und Nägel (die einen Ausscheidungsweg für Schwermetalle darstellen), Speichel, Zähne, Leber, Niere, Knochen usw. Hierbei ist man zum Teil auf Biopsiematerial angewiesen.

Eine Reihe von Arbeiten haben den Zahnstein als Indikator für eine Schwermetallbelastung bestätigt (siehe S. 10 ff.).

(1): 27: Münchner Teil der Süddeutschen Zeitung

(2): 20: S. 1

4.2. Mechanismus der Einlagerung von Schwermetallen in den Zahnstein

Zahnstein stellt "harte Ablagerungen an den Zahnkronen als Ausfällungen von Kalziumsalzen des Speichels" dar, "vermischt mit organischen Gewebsresten und Mikroorganismen." (1). Der Speichel ist ein Ausscheidungsweg für Schwermetalle. Während der Zahnsteinbildung werden somit Schwermetalle in den Zahnstein eingebaut. Gleichzeitig können Schwermetalle durch Ionenaustauschreaktionen in oberflächliche Schichten eingelagert werden, aber auch - vor allem bei saurem Milieu - herausgelöst werden (2). Dies ist wohl zu vergleichen mit der Anreicherung von Schwermetallionen in äußeren Schichten des Zahnschmelzes, und diese wiederum funktioniert ähnlich der Fluoranreicherung (3).

Die Analyse von Zahnstein gibt damit Auskunft über die Schwermetallbelastung im Zeitraum von der Bildung des Zahnsteins bis zu seiner Entfernung; eine zu geringe Einwage an Zahnstein läßt allerdings keine genaue Analyse zu. Folglich werden zur Probennahme Patienten bevorzugt, bei denen viel Zahnstein vorgefunden wird. Der Zeitraum, in dem "genügend" Zahnstein gebildet wird, beträgt in der Regel zwei bis drei Jahre (4). Das bedeutet, daß durch Zahnsteinuntersuchungen eine mittelfristige Belastung aufgezeigt werden kann.

Der Vorteil von Zahnstein gegenüber anderen Materialien besteht darin, daß er leicht zu gewinnen ist.

(1): 8: S. 676

(2): 31

(3): 3: S. 50 f., 4: S. 65 ff.

(4): 30: S. 43

4.3. Bisherige Untersuchungsergebnisse über Zahnstein

4.3.1. Blei

Bereits 1912 untersuchte HINTZE Zahnstein auf Blei; er ermittelte bei Bleiarbeitern einen Bleigehalt von 835 ppm (=µg/g) (1). MINKER konnte 1928 in zwei Fällen bei Bleiarbeitern das Schwermetall im Zahnstein "mit vollkommener Sicherheit" feststellen (2). Andere (SCHENKEL 1929, SCHMIDT 1933, PFRIEME 1934) fanden kein Blei im Zahnstein (3). Allerdings muß berücksichtigt werden, daß eine quantitative Bestimmung von so geringen Schwermetallkonzentrationen mit den damaligen Untersuchungsmethoden unmöglich war.

1977 untersuchten SONNABEND, SANSONI, HERZOG und KRACKE den Zahnstein auf Blei- und Cadmiumgehalt. Männer hatten deutlich höhere Bleiwerte als Frauen. Bei Cadmium wiesen die männlichen Probanden zwar ebenfalls höhere Werte auf, allerdings war der Unterschied kleiner. Verschiedene, schwermetallbelastete Berufszweige zeigten bis zu zehnmal höhere Blei-Mittelwerte*) als nicht-exponierte Normalpersonen. Besonders betroffen waren Arbeiter in einer chemischen Fabrik, die Bleistearat herstellte, und Arbeiter in der Automobilindustrie (Schleifer, Lötter, Polierer).

Für Blei ergab die Untersuchung folgende Werte:

Tabelle 1. Bleigehalt bei Personen verschiedener Berufszugehörigkeit.

	(ppm)	Mittelwert ¹⁾	Standardabw.	n
Normalpersonen ²⁾ männlich	5,58	6,23	75	
weiblich	1,92	1,64	30	
Verkehrspolizisten	10,98	10,30	24	
Arbeiter einer Akkumulatorenfabrik	14,01	9,21	9	
Arbeiter einer chemischen Fabrik	45,34	34,99	9	
Arbeiter im Autobau	52,87	50,75	40	

Anm.: 1) Medianwerte waren nicht angegeben.

2) Patienten der Universitätszahnklinik München, also überwiegend städtische Bewohner.

n = Zahl der untersuchten Objekte.

(1), (2), (3): 3: S. 13 f., 33, 34, 35

*) hier und auf den nachfolgenden Seiten ist jeweils der arithmetische Mittelwert gemeint.

Damit konnte der Einfluß des Arbeitsplatzes auf die Bleiexposition dargestellt werden (1).

EMSLANDER und SONNABEND stellten 1978 eine Verbindung des Bleigehalts im Zahnstein zu dem in Zahnkrone, Zahnwurzel, Alveolarknochen und Venenblut her. Sie untersuchten 21 normal-zivilisatorisch Belastete und fünf beruflich Bleiexponierte. Die Letzteren hatten stark erhöhte Bleigehalte bei allen untersuchten Parametern.

Bei Normalpersonen hatte der Zahnstein keine signifikanten Unterschiede zu Zahnwurzel und Alveolarknochen gezeigt, der Bleigehalt der Zahnkrone lag hochsignifikant niedriger.

Bei beruflich Belasteten ließ der Zahnstein keine Wechselbeziehung zu den anderen Parametern erkennen (2).

Tabelle 2. Bleigehalt verschiedener Körpergewebe bei Nicht-Exponierten. (ppm)			
untersuchtes Material	Mittelwert	Standardabw.	n
Zahnstein	4,37	2,12	18
Zahnkrone	3,17	1,40	20
Zahnwurzel	5,41	2,28	19
Alveolarknochen	4,95	1,51	20
venöses Blut	12,01	3,55 ($\mu\text{g}/100 \text{ ml Blut}$)	19

Die folgende Tabelle der beruflich Belasteten muß kritisch beurteilt werden, da sie sich auf nur fünf Probanden stützen kann (3).

Tabelle 3. Bleigehalt verschiedener Körpergewebe bei beruflich Belasteten. (ppm)			
untersuchtes Material	Mittelwert	Standardabw.	n
Zahnstein	25,1 ¹⁾	9,7	4
Zahnkrone	13,7	6,8	5
Zahnwurzel	63,5	30,4	5
Alveolarknochen	90,4 ¹⁾	52,5	4
venöses Blut	66,5	25,7 ($\mu\text{g}/100 \text{ ml Blut}$)	5

Anm.: 1) nach Eliminierung eines Ausreißers.

(1): 7: S. 14 ff.

(2): 3: S. 48, S. 53 f.

(3): 3: S. 40 ff.

1979 verglich BACZYK in Polen Zahnstein beruflich bleibelasteter Arbeiter mit dem in einer Kontrollgruppe von Buchhaltern. Der Bleigehalt im Zahnstein der Arbeiter war mit 34,23 µg/g ungefähr sechsmal höher als der der Kontrollgruppe mit 5,65 µg/g (angegeben sind die Mittelwerte). Die Zahnsteinproben mit Einwaagen von 20 bis 100 mg wurden mit der flammenlosen Atomabsorptionsmethode auf Blei analysiert (1).

1979 untersuchte HOHMANN in seiner Dissertation den Bleigehalt des Zahnsteins bei Parodontopathien. Er kam auf folgende Ergebnisse:

Parodontitis marginalis profunda:

Median: 4,95
95%-Vertrauensbereich: 3,5 - 7,8
Anzahl der Proben: 51

Parodontitis marginalis superficialis:

Median: 8,90
95%-Vertrauensbereich: 5,5 - 20,6
Anzahl der Proben: 46

Die Parodontitis marginalis profunda hatte hochsignifikant niedrigere Werte als die superfizielle (2).

1982 ermittelte SONNTAG-DIERKS den Blei- und Cadmiumgehalt des Zahnsteins und der Milchzähne im Gebiet verschiedener Blei- und Zinkhütten in Goslar (Norddeutschland). Damit konnte gezeigt werden, daß Industriearbeiter stärker belastet sind als die Normalpersonen.

Für den Zahnstein werden folgende Bleiwerte angegeben (3):

Tabelle 4. Bleigehalt des Zahnsteins in verschieden belasteten Gebieten. (ppm)					
Kollektiv	Mittelw.	s	Median	95% - Vb.	n
Industriearbeiter	11,4	11,0	7,8	2,6 - 15,2	15
Bewohner von Unter- oker/ Oberoker	3,83	3,02	2,25	1,6 - 5,0	32
Bewohner von Goslar	2,29	2,51	1,4	0,65 - 2,9	18
Bew. von Wolfsburg	<2,20	>1,98	<1,5	<1,4 - 1,6	41

Anm.: s = Standardabweichung

Unter-/Oberoker: Ortsteil von Goslar mit Bleihütte

Goslar-Bewohner: hüttenentfernte Stadtteile

Bew. von Wolfsburg: industriell unbelasteter Stadtrand

(1): 24: S. 26, 6: S. 403

(2): 9: S. 28

(3): 24: S. 45

Eine weitere Arbeit über Schwermetalle im Zahnstein kommt von KOBAYASHI aus Japan (1982). Er untersuchte 64 Proben auf Blei-, Cadmium- und Zinkgehalt in Tokio und der Region Ichikawa.

Zur Aufbereitung der Proben benutzte er das gleiche Verfahren wie die oben zitierten deutschen Arbeiten. Gemessen wurde mit der Atomabsorptionsspektrometrie. Für Blei kommt KOBAYASHI auf folgende Werte:

Gesamtmittelwert:	16,66 $\pm$ 10,43 ppm Pb	
Gesamtmedian:	7,78 ppm Pb	
Mittelwert Tokio:	6,62 ppm Pb	Tokio: n=17
Median Tokio:	5,72 ppm Pb	
Mittelw. Ichikawa:	20,29 ppm Pb	Ichikawa: n=47
Median Ichikawa:	8,26 ppm Pb	

Es lag eine linkssteile Verteilung vor. Aus dem Artikel in der japanischen Zeitschrift geht nicht hervor, ob die Region Ichikawa schwermetallbelastet ist oder nicht (im Vergleich zu Tokio) (1).

HAVLIK und Mitarbeiter untersuchten 1983 den Zahnstein auf Bleigehalt bei drei Gruppen mit unterschiedlicher Schwermetallbelastung. Als Verfahren wählten sie die Atomabsorptionsspektrometrie. Die Einwaagen der Proben betrugen bis 70 mg, die Untersuchung wurde in der Tschechoslowakei durchgeführt.

Für die einzelnen Gruppen wurden folgende Werte ermittelt (2). *)

Tabelle 5. Der Bleigehalt bei unterschiedlich Belasteten. (ppm)					
Kollektiv	Mittelwert	s	Max.	Min.	n
Landbewohner	0,26	0,526	1,92	0,05	36
Großstadtbewohner (Prag)	4,53	3,935	13,64	0,05	32
Stadt mit Bleihütte	31,49	15,19	71,76	12,21	28

Anm.: s = Standardabweichung
n = Zahl der untersuchten Objekte
Max. = höchster gemessener Wert
Min. = niedrigster gemessener Wert

(1): 11: S. 1688 ff.

(2): 6: S. 402 ff.

*) Für die Übersetzung des Artikels aus dem Tschechischen ins Deutsche möchte ich mich bei Frau M. Piehlmeier herzlich bedanken.

1985 untersuchte OHNEIS den Blei- und Cadmiumgehalt im Zahnstein von Zementwerksarbeitern und verglich diesen mit Normalpersonen.

Für Blei zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Arbeitern und der Kontrollgruppe. In der Kontrollgruppe hatten Raucher höhere Bleiwerte als Nichtraucher. Das Ergebnis sah so aus (1):

Tabelle 6. Der Bleigehalt bei Zementwerksarbeitern und Normalpersonen. (ppm)

Kollektiv	Mittelwert	s	Median	95% - Vb.	n
Zementwerksarbeiter	3,491	3,250	2,279	1,750-2,947	60
Kontrollgruppe	2,523	1,669	2,287	1,554-2,934	54
Nichtraucher/Kontr.	2,091	1,328	1,743	1,307-2,622	31
Raucher/Kontrolle	3,105	1,921	3,093	2,198-3,889	23

Anm.: s = Standardabweichung

n = Zahl der untersuchten Objekte

95% - Vb. = 95% - Vertrauensbereich

4.3.2. Cadmium

Erste Untersuchungen des Zahnsteins auf Cadmium finden sich bei SONNABEND, SANSONI, HERZOG und KRACKE (1977). Wie beim Blei wurden auch beim Cadmium je nach Beruf unterschiedliche Belastungen festgestellt. Chemiarbeiter, in deren Betrieb Cadmiumstearat hergestellt wurde, hatten die höchsten Werte, gefolgt von der Gruppe der Verkehrspolizisten. Die Abgase der Dieselmotoren sollen für die erhöhte Cadmiumbelastung maßgeblich sein. Arbeiter in der Autoindustrie waren weniger belastet, und die Arbeiter im Akku-Bau wiesen sogar geringere Werte als die Normalpersonen auf. Der Grund dafür ist laut HERZOG in hervorragender Arbeitsplatzhygiene und im Standort der Fabrik (40 km östlich von München, ländliches Gebiet) zu sehen (2).

(1): 16

(2): 7: S. 20 ff.

In Zahlen drückt sich das Ergebnis so aus (1):

Tabelle 7. Cadmiumgehalt bei Personen verschiedener Berufs- zugehörigkeit. (ppm)				
Beruf	Mittelwert ¹⁾	Standardabweichung	n	
Normalpersonen männlich	0,11	0,10	75	
weiblich	0,084	0,096	30	
Verkehrspolizisten	0,49	0,43	24	
Arbeiter im Akku-Bau	0,04	0,07	9	
Chemiearbeiter	0,84	0,83	9	
Arbeiter i. d. Autoind.	0,27	0,22	40	

Anm.: 1) kein Median verfügbar

SONNTAG-DIERKS (1982) kam auf folgende Werte (2):

Tabelle 8. Cadmiumgehalt des Zahnsteins in verschiedenen bela- steten Gebieten. (ppm)						
Kollektiv	Mittelwert	s	Median	95% - Vb.		n
Industriearbeiter	0,958	1,21	0,34	0,1	- 3,9	15
Bewohner von Unter- oker/Oberoker	0,265	0,177	0,215	0,08	- 0,70	32
Bewohner von Goslar	0,29	0,34	0,19	0,02	- 1,54	18
Bew. von Wolfsburg	0,26	0,17	0,18	0,15	- 0,98	41

Anm.: s = Standardabweichung
95% - Vb. = 95% - Vertrauensbereich
n = Zahl der untersuchten Objekte

KOBAYASHI (Japan 1982) fand folgende Werte:

Gesamtmittelwert:	7,30 $\pm$ 6,33 ppm Cd	n=64
Gesamtmedian:	2,31 ppm Cd	
Mittelwert Tokio:	7,45 ppm Cd (mit 1 Ausreißer)	n=17
	1,47 ppm Cd (ohne 1 Ausreißer)	n=16
Median Tokio:	0,92 ppm Cd	
Mittelw. Ichikawa:	7,25 ppm Cd	Ichikawa:n=47
Median Ichikawa:	2,54 ppm Cd	

Es lag eine linkssteile Verteilung vor. Im Vergleich zu den anderen Arbeiten sind die Cadmiumwerte extrem hoch (3).

- (1): 7: S. 16 ff.
(2): 24: S. 46
(3): 11: S. 1688 ff.

1983 wurde von UYGUN der Cadmiumgehalt des Zahnsteins bei verschiedenen Rauchgewohnheiten untersucht. Die Probanden wurden in Nichtraucher, Schwachraucher (unter 20 Zigaretten pro Tag), Starkraucher (über 20 Zigaretten pro Tag) und Zigarrenraucher eingeteilt. Das Ergebnis sah so aus (1):

Tabelle 9. Cadmiumgehalt im Zahnstein bei verschiedenen Rauchgewohnheiten. (ppm)				
Kollektiv	Mittelw.	s	Median	n
Nichtraucher	0,017	0,021	0,010	43
Schwachraucher	0,052	0,054	0,024	32
Starkraucher	0,138	0,132	0,093	29
Zigarrenraucher	0,192	0,189	0,130	30

Mit der Rauchmenge stieg der Cadmiumgehalt. Zwischen weiblichen und männlichen Nichtrauchern bestand kein signifikanter Unterschied. Der Cadmiumgehalt bei ausländischen Rauchern lag mit einem Median von 0,127 ppm deutlich über dem Median des Zahnsteins von deutschen Rauchern mit 0,045 ppm. Weibliche Raucher wiesen einen höheren Median auf als männliche Raucher. Das Gesamtkollektiv "Raucher" hatte einen Median von 0,070 ppm Cd.

Ein Zusammenhang zwischen Alter des Zahnsteins und dem Cadmiumgehalt konnte nicht gefunden werden (2).

OHNEIS (1985) fand in seiner Untersuchung über den Blei- und Cadmiumgehalt im Zahnstein von Zementwerksarbeitern und Normalpersonen einen höheren Mittelwert, aber niedrigeren Median für die Zementwerksarbeiter (für Cadmium). In der Kontrollgruppe zeigten die Raucher höhere Cadmiumgehalte als die Nichtraucher.

Folgende Werte wurden ermittelt (3):

-
- (1): 30: S. 35
 - (2): 30: S. 40 ff.
 - (3): 16

Tabelle 10. Cadmiumgehalt bei Zementwerksarbeitern und Normalpersonen. (ppm)					
Kollektiv	Mittelwert	s	Median	95% - Vb.	n
Zementwerksarbeiter	0,097	0,252	0,004	0,000-0,013	60
Kontrollgruppe	0,050	0,057	0,033	0,022-0,050	54
Nichtraucher/Kontr.	0,042	0,063	0,022	0,009-0,039	31
Raucher/Kontrolle	0,062	0,044	0,055	0,032-0,072	23

5. Eigene Untersuchungen

5.1. Probennahme

Unsere Zahnsteinproben wurden in neun zahnärztlichen Praxen im Gebiet um den Hohenpeißenberg gewonnen. Gleichzeitig mit der Probennahme füllten die an der Untersuchung beteiligten Patienten Fragebögen aus, mit denen wir die Lebensgewohnheiten der Patienten ergründen wollten.

Die Probennahme erfolgte von April bis August 1985.

Der Zahnstein wurde mit Hilfe von Ash-Hartmetallinstrumenten entfernt und auf ein Filterpapier gebracht. Dieses Filterpapier wurde gefaltet und mit doppelt destilliertem Wasser gespült, um den Zahnstein von Speichel und sonstigen Verunreinigungen, die zu Gewichtsverfälschungen führen können, zu befreien, und anschließend an der Luft getrocknet. Mit dem Trocknen kann Mikroorganismen im Zahnstein die Grundlage zur Vermehrung entzogen werden.

Bis zur Analyse erfolgte die Lagerung der Zahnsteinproben zusammen mit dem Filterpapier in bleifreien, luftdicht verschlossenen Kunststoffproberöhrchen.

Bei der Probennahme konnte nicht nach sub- und supragingivalen Ablagerungen unterschieden werden.

5.2. Allgemeines über die Atomabsorptionsspektrometrie

Für den Nachweis von Spurenelementen stehen mehrere Methoden zur Verfügung, beispielsweise die Neutronenaktivierung, die Isotopen-Verdünnungs-Spektrometrie, die Colorimetrie, die Röntgenfluoreszenz-Analyse, die Atomabsorptionsspektrometrie und andere (1). Manche Verfahren haben an Bedeutung verloren (zB. die Dithizon-Methode), andere sind aufwendig und teuer (2), außerdem unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich ihres Anwendungsgebietes (3).

Bei unserer Untersuchung wählten wir die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in ihrer flammenlosen Ausführung im Graphitrohr. Diese Methode wurde schon bei früheren Zahnstein-Untersuchungen verwendet, ist die geeignetste dafür und wird allgemein bei Spurenelementanalysen häufig benutzt.

Das gleiche Meßverfahren wie bei früheren Untersuchungen läßt eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse erwarten. Die Atomabsorptionsspektrometrie vereint eine hohe Spezifität bei ausreichender Empfindlichkeit mit guter Präzision (im Fall von Wiederholungsmessungen) und guter absoluter Genauigkeit (Accuracy).

Da bei unserer Untersuchung zum Teil extrem niedrige Konzentrationen an Blei und Cadmium zu finden waren, stellte sich das Problem der Nachweisgrenze. Darauf soll später eingegangen werden.

5.3. Chemische Analyseschritte

Nach Trocknen im Exsiccator bei 55° C bis zur Gewichtskonstanz wurden die Proben auf einer Präzisionswaage (Firma Sartorius, Genauigkeit 0,00001 Gramm) gewogen. Um eine Kontamination zu vermeiden wurden nur Chemikalien verwendet, die dem Kriterium "pro analysi" oder

(1): 14: S. 6 ff., 28: S. 15 ff.

(2): 30: S. 30 f.

(3): 31

"suprapur" entsprachen.

Zur Naßveraschung wurden die Proben mit konzentrierter Salpetersäure (65%ig, nachdestilliert) versetzt und in einem Aluminiumblock auf einer Heizplatte bei 90° C aufgelöst. Zu dieser zunächst trüben Lösung wurde vorsichtig tropfenweise Wasserstoffperoxid (30%ig) zugesetzt bis eine wasserklare Lösung vorlag. Hierbei spricht man von der Naßveraschung mit OH-Radikalen aus $\text{H}_2\text{O}_2/\text{Fe}^{2+}$ nach SANSONI und KRACKE (1968) (1). Die Veraschung beruht auf der oxidativen Wirkung der dabei entstehenden OH-Radikale. Fe^{2+} -Ionen in geringen Spuren werden als Katalysator benötigt (Fentons Reagenz).

Im Anschluß daran wurde die Lösung bis zum Trocknen eingeeengt und mit 0,4 normaler Salpetersäure auf etwa zwei Milligramm Probeneinwaage pro Milliliter Lösung eingestellt. Damit während der Durchführung der chemischen Analyseschritte keine Bleispuren, die aus dem Zahnstein stammen, verloren gehen, wurde zu Beginn der Analyse eine definierte Menge radioaktives Blei 212 zugesetzt (Gleiches geschah mit Cadmium). Am Ende der Veraschung konnte durch eine Kontrollmessung festgestellt werden, ob ein Teil des radioaktiven Bleis verloren ging (zum Beispiel durch Anlagerung an Gefäßwände). Eventuelle Blei- oder Cadmiumverluste können auf diese Weise erfaßt und berücksichtigt werden. Bei unserer Untersuchung war allerdings während der Analyse kein Verlust an Blei oder Cadmium festzustellen.

5.4. Bestimmung von Blei und Cadmium im Atomabsorptionsspektralphotometer

5.4.1. Prinzip am Beispiel Blei

Bei der flammenlosen Atomabsorptionsspektrometrie wird die bleihaltige Analysenprobe zunächst verdampft und mit einem beheizten Graphitrohr eine Wolke von Bleiatomen erzeugt. Schickt man durch diese Wolke mit Hilfe einer

(1): 17: S. 1107 ff.

element-spezifischen Hohlkathodenlampe Licht mit einer Resonanzlinie des Bleis von 283,3 nm (bei Cadmium 228,8 nm), so wird dieses absorbiert und somit geschwächt. Durch Messung des geschwächten Lichts und Vergleich mit der Lichtschwächung von Eichlösungen bekannter Bleimengen kann man den Bleigehalt der Analysenprobe bestimmen.

5.4.2. Eichung

Die Anwesenheit anderer Elemente neben Blei und Cadmium kann die Messung beeinflussen. Daher wurde eine Eichlösung geschaffen, die eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie die Zahnsteinlösung hatte (etwa 77,4 % Asche; ca. 34,2 % Ca, 18,9 % P, 0,9 % Mg, 0,046 % F). Dieser wurden definierte Mengen Blei (10-50 mg/l) bzw. Cadmium (1-5 mg/l) zugegeben, um daraus eine Eichkurve abzuleiten.

Neben den obengenannten Störungen des Meßsignals kann bei der Verdampfung der Analysenprobe durch Rauchentwicklung die Blei- bzw. Cadmiumlinie geschwächt werden und somit einen zu hohen Blei- bzw. Cadmiumgehalt vortäuschen. Diese unspezifische Absorption durch Rauch kann entstehen, wenn die Zahnsteinkonzentration im Graphitrohr zu hoch ist. Der Grenzwert bis zur Entstehung eines Rauchpeaks kann gemessen werden und liegt etwa bei 2,3 mg Zahnstein pro Milliliter Lösung. Höhere Konzentrationen werden mit destilliertem Wasser verdünnt.

5.4.3. Messung

Die chemische Aufbereitung und die Messung der Zahnsteinproben wurden in der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF) in Neuherberg bei München durchgeführt (Arbeitsgruppe "Spurenelementanalytik",

Leiter Dr. P. Schramel; Ausführung der Untersuchung von Frau Dr. A. Wolf).*)

Es wurde mit dem Absorptions-Spektralphotometer Z-5000 und der Graphitrohrküvette HGA 500 der Firma PERKIN-ELMER gemessen.

Von der Probelösung spritzte das Gerät automatisch 20 μ l in das kalte Graphitrohr. Dort wurde die Probe in der 1. Trocknungsstufe 40 Sekunden bei 130° C vorbehandelt und nach einer 2. Trocknungsstufe, die 20 Sekunden bei 350° C dauerte, in die Zersetzungsstufe (500° C, 11 sec.) übergeführt. Danach erfolgte ein rascher Temperaturanstieg auf 2500° C, wo die Probe 5 Sekunden atomisiert wurde. Die dabei beobachtete Extinktion wurde registriert.

Die Reproduzierbarkeit bei Wiederholung der Messung betrug bei Bleikonzentrationen von 5-20 μ g/l etwa ± 10 %, bei 10-100 μ g/l ± 5 %, für Cadmiumkonzentrationen von 0,1 bis 1 μ g/l etwa 10 %.

Das Meßergebnis entstand aus Doppelmessungen, die in der Regel denselben Wert anzeigten. Wichen die zweite Messung von der ersten ab, wurde nochmals gemessen. Stimmt bei diesen drei Messungen zwei überein, wurde dieser Wert verwendet, wichen alle Messungen voneinander ab, wurde der arithmetische Mittelwert gebildet.

Zahnstein-Einwaagen unter 5 mg wurden nicht analysiert, da dies zu wenig Material darstellte, um ein genaues Ergebnis liefern zu können. Von den ursprünglich 93 Proben kamen damit 13 nicht in die Wertung.



Die 80 untersuchten Proben verteilten sich wie folgt:

5 - 10,0 mg:	23 $\hat{=}$ 29 %
10,1 - 20,0 mg:	22 $\hat{=}$ 28 %
20,1 - 40,0 mg:	16 $\hat{=}$ 20 %
über 40,0 mg:	19 $\hat{=}$ 24 %

Somit waren 72 % sogar über 10 mg.

*) Herrn Dr. Schramel und Frau Dr. Wolf sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Den Einfluß der Masse auf die Genauigkeit der Ergebnisse soll folgende Graphik veranschaulichen, die nach den Werten der Arbeit von HOHMANN (1979) (1) über den Bleigehalt bei Parodontopathien zusammengestellt wurde. Die Graphik unterscheidet nicht zwischen Parodontitis marginalis superficialis und profunda, es sind aber im linken und rechten Histogramm in etwa gleiche Anteile an Parodontitis marginalis superficialis und an Parodontitis marginalis profunda enthalten.



Bei den Einwaagen unter 5 mg streuen die Werte ungleich mehr als bei den Einwaagen über 10 mg. Auch die Mediane unterscheiden sich. Der Median ("unter 5 mg Einwaage") liegt bei 9,0 ppm, der Median ("über 10 mg Einwaage") beträgt 5,1 ppm.

6. Kollektivbeschreibung

6.1. Probanden

Die Gruppe der Probanden besteht aus den Bewohnern des Gebietes um den Hohenpeißenberg.

An Hand von Fragebögen (siehe abgebildeten) ergründeten wie die Lebensgewohnheiten der Patienten. Wir fragten nach Wohnort, Alter, Nationalität, Geschlecht

(1): 9: S. 16 ff.

Untersuchung über den Schwermetallgehalt im Zahnstein
bei Bewohnern des Gebietes um den Hohenpeißenberg

(bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen)

1. Wohnort: Alter: Jahre
Nationalität: Geschlecht: m / w
-
2. Beruf:
Wo üben Sie Ihren Beruf aus (Ort) ?
-
3. Wohnen oder arbeiten Sie an einer viel befahrenen
Straße ? ☐ ja
☐ nein
-
4. Rauchen Sie ? ☐ Nichtraucher
☐ bis 20 Zigaretten pro Tag
☐ über 20 Zigaretten pro Tag
☐ Zigarrenraucher
☐ Pfeifenraucher
-
5. Essen Sie viel Gemüse oder Obst aus dem eigenen Garten?
☐ ja
☐ nein
Essen Sie aus Keramikgeschirr ?
☐ ja
☐ nein
-
6. Vom Zahnarzt auszufüllen: Liegen Parodontopathien vor?
☐ nein
☐ ja, und zwar: Parodontitis marg. superf. ☐
Parodontitis marg. prof. ☐

(Frage 1), nach dem Beruf und dem Arbeitsort, ob die Patienten an einer viel befahrenen Straße wohnen oder nicht (Frage 3), nach dem Rauchverhalten (Frage 4), ob die Patienten viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten essen oder ob sie aus Keramikgeschirr essen (Frage 5), sowie nach Parodontopathien (Frage 6). Die letzte Frage war vom Zahnarzt zu beantworten.

Die Namen der Patienten erfragten wir aus Gründen des Datenschutzes nicht. Es wurden nicht alle Fragebögen sorgfältig ausgefüllt.

Bei den Fragen handelt es sich um Parameter, die den Blei- und Cadmiumgehalt im Zahnstein beeinflussen können, wie sich zum Teil in früheren Arbeiten gezeigt hat.

Mit der Frage nach dem Wohn- und Arbeitsort wollten wir sicherstellen, daß die Patienten auch im Gebiet um den Hohenpeißenberg leben und nicht nur auf der Durchreise sind. Mit der Frage nach der Nationalität sollte eine möglicherweise andere Speichelszusammensetzung durch andere Ernährungsgewohnheiten bei Ausländern berücksichtigt werden, außerdem haben ausländische Raucher bei der Untersuchung von UYGUN (1) höhere Cadmiumgehalte als deutsche Raucher gehabt. Mit der Frage nach Geschlecht und Alter wollten wir überprüfen, ob Männer und Frauen sowie Alte und Junge eine unterschiedliche Belastung aufweisen.

Die 3. Frage hatte das Ziel, aufzudecken, ob die Abgase einer viel befahrenen Straße für eine Blei²belastung verantwortlich sein kann. Die Beantwortung der 3. Frage ist subjektiv, zu berücksichtigen ist dabei, daß es im Gebiet Peißenberg keine Straßen mit mehr als einer Fahrspur pro Richtung gibt. Somit ist eine viel befahrene Straße auf dem Land anders zu be-

urteilen als in der Stadt.

Bei der 5. Frage ließen wir uns von folgendem Gedanken leiten: Wenn eine Schwermetallbelastung der Luft am Hohenpeißenberg vorliegt, müßte sich das bei den Patienten bemerkbar machen, die viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten essen. Mit der 5. Frage wollten wir außerdem prüfen, ob Keramikgeschirr, das cadmiumhaltige Farben enthalten kann, für eine Cadmiumbelastung in Frage kommt. Allerdings waren sich viele Patienten bei der Beantwortung dieser Frage nicht sicher, ob sie Geschirr mit Keramikfarben benutzen oder nicht.

Die Parameter "Rauchverhalten" und "Parodontopathien" von Frage 4 und 6 haben in früheren Arbeiten unterschiedliche Belastung an Cadmium und Blei gezeigt. Deshalb nahmen wir diese Fragen in unseren Fragebogen auf.

Hier die Kollektivbeschreibung nach Auswertung der Fragebögen (in tabellarischer Form):

Wohnort:	Zahl	rel. Häufigk.
Peißenberg	44	≈ 56 %
Hohenpeißenberg	11	≈ 14 %
Oberhausen	9	≈ 11 %
Peiting	7	≈ 9 %
Schongau, Böbing	je 2	≈ je 3 %
Weilheim, Forst, Huglfing, Tauting	je 1	≈ je 1 %
	79	100 %

Arbeitsort:		
Peißenberg	35	≈ 44 %
Hohenpeißenberg, Peiting, Weilheim	je 6	≈ je 8 %
Oberhausen, Landkr. Weilheim	je 4	≈ je 5 %
München	3	≈ 4 %
Huglfing, Murnau, Schongau	je 2	≈ je 3 %
Altenstadt, Anfeldorf, Bayern, Böbing, Grasserhof, Höhen- ried, Karwendl-Geb., Oder- ding, Tutzing	je 1	≈ je 1 %
	79	100 %

Nationalität:	76 Deutsche	± 99 %
	1 Italiener	± 1 %
Geschlecht:	39 männlich	± 49 %
	41 weiblich	± 51 %
Wohnen oder Arbeiten an viel befahrener Straße	28 ja	± 35 %
	52 nein	± 65 %
Rauchverhalten:	54 Nichtraucher	± 68 %
	19 unter 20 Zig./d	± 24 %
	6 über 20 Zig./d	± 8 %
Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten:	45 ja	± 57 %
	34 nein	± 43 %
Essen aus Keramikgeschirr:	20 ja	± 31 %
	45 nein	± 69 %
Parodontalerkrankungen:	14 keine Erkrankung	± 18 %
	23 mit Parodontitis marg. superf.	± 30 %
	40 mit Parodontitis marg. prof.	± 52 %
Durchschnittsalter:	47,4 Jahre	
Berufe (grobe Einteilung):		
	22 Hausfrauen, Rentner	± 31 %
	17 Angestellte u.ä. (zB. Büroangest., Verkäuferinnen, Krankenpfleger, Bedienung, Bauamtsleiter, etc.)	± 24 %
	16 Handwerker (zB. Elektriker, Maschinist, Mechaniker, Metzger, Schlosser, Dreher, etc.)	± 23 %
	5 Arbeiter	± 7 %
	4 Landwirte	± 6 %
	4 Kraftfahrer	± 6 %
	2 Selbständige, zB. Zahnarzt	± 2 %
	<u>70</u>	<u>99 %</u>

6.2. Kontrollgruppe

Wir hatten keine "eigene" Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe wurde gebildet aus den Daten der Arbeiten von UYGUN und OHNEIS (1). Diese Arbeiten beruhen auf einem identen Verfahren hinsichtlich Probennahme, Aufbereitung und Messung. Es wurden sämtliche Daten der Untersuchung von UYGUN verwendet (zur Erinnerung: UYGUN analysierte den Cadmiumgehalt im Zahnstein bei verschiedenen Rauchgewohnheiten), zu diesen Observationen fügten wir die "Kontrollgruppe" von OHNEIS hinzu.

Die Kontrollgruppe von OHNEIS besteht aus "Normalpersonen", das heißt nicht schwermetallbelasteten Patienten, denen der Zahnstein entfernt wurde. Die Normalpersonen kommen aus Abensberg/Niederbayern, einer Kleinstadt ohne bedeutende Industrie (2).

Die Patienten von UYGUN stammen überwiegend aus München, sind also Stadtbewohner (3).

Bei der Probennahme von UYGUN und OHNEIS wurden den Patienten nicht die gleichen Fragen gestellt wie unseren. Lediglich die Frage nach dem Geschlecht stimmt mit unserer überein, beim Rauchverhalten wurde eine andere Abstufung gewählt, nämlich "Nichtraucher", "bis 10 Zigaretten pro Tag", "bis 20 Zigaretten pro Tag" und "über 20 Zigaretten pro Tag" (unsere Abstufung war: "Nichtraucher", "bis 20 Zigaretten pro Tag", "über 20 Zigaretten pro Tag"). Um dieses Problem zu lösen, vergleichen wir in unserer Auswertung in Punkt 8.2. nicht Schwach- und Starkraucher etc., sondern lediglich Nichtraucher und Raucher.

Folgende Variablen von "Probanden" und "Kontrollgruppe" sind bei beiden vorhanden und damit vergleichbar:

1. Geschlecht
2. Rauchmenge (Nichtraucher/Raucher)
3. Bleigehalt (in $\mu\text{g/g}$)
4. Cadmiumgehalt (in $\mu\text{g/g}$)

(1): 30, 16 Die Originaldaten von UYGUN und OHNEIS sind in der Zahnklinik München auf Datenplatte gespeichert.

(2): 16 (3): 30

7. Meßergebnisse

7.1. Problematik der Nachweisgrenze

Bei unseren Zahnsteinproben wurden extrem niedrige Cadmium- und Bleiwerte ermittelt. Zahlenwerte auf drei Dezimalen genau und Werte unter 0,05 ppm Cd bzw. unter 0,5 ppm Pb müssen kritisch beurteilt werden, da in so geringen Konzentrationsbereichen Verunreinigungen das Meßergebnis verfälschen können, vor allem wenn man die kleinen Einwaagen berücksichtigt.

Bei Messungen in den genannten Konzentrationsbereichen kann nicht ausgeschlossen werden, daß ein erheblicher Anteil der gemessenen Blei- und Cadmiumwerte nicht aus dem Zahnstein stammt, sondern verfahrensbedingt ist und zum Beispiel aus den verwendeten Lösungen, Gefäßen und Geräten herrührt. Möglicherweise kommt ein Teil der Schwermetalle im Zahnstein von den Scalern, mit denen der Zahnstein entfernt wurde; es kann eine Kontamination durch die Luft während des Trocknens bei der Probenahme erfolgen (auch wenn die Luft als unbelastet einzustufen ist).

Ferner: Läßt man eine Lösung mit niedrigen Schwermetallkonzentrationen einige Stunden an der Luft stehen und mißt man danach nochmal, so findet man höhere Werte. Dies zeigt, wie empfindlich die Atomabsorptionsspektrometrie auf scheinbar unbedeutende Veränderungen reagiert (1).

Die Werte von 0,05 ppm Cd bzw. 0,5 ppm Pb sehen Fachleute der chemischen Analytik für Zahnstein als Nachweisgrenze an, wenn mit der Atomabsorptionsspektrometrie gemessen wird (2), allerdings gibt es andere Meinungen, die besagen, daß auch niedrigere Werte Aussagekraft haben (3).

(1): 1

(2): 1, 22, 31

(3): 2

Bei unserer Untersuchung lagen 93 % aller Bleiwerte und 96 % aller Cadmiumwerte unter den oben genannten Grenzen. Eine Schwermetallbelastung für Blei oder Cadmium war nicht festzustellen.

Um Signifikanztests durchführen zu können und unsere Resultate mit anderen Arbeiten vergleichen zu können, geben wir in unserer Untersuchung niedrigere Werte als 0,5 ppm für Blei und 0,05 ppm für Cadmium an. Diese müssen allerdings kritisch betrachtet werden.

Der Unterschied der "kritischen Grenze" für Blei und Cadmium von 0,5 und 0,05 ppm liegt darin, daß die große Menge an Calcium im Zahnstein zu Verfälschungen führen kann, vor allem bei der Messung des Bleigehalts, zum Beispiel weil sich Blei dem Calcium anlagert.

7.2. Originaldaten "Probanden" und "Kontrollgruppe"

Auf den nächsten Seiten folgt der Computer-Ausdruck der Originaldaten von "Probanden" und "Kontrollgruppe".

ORIGINAL-DATEN (PROBANDEN)

GRUPPE	MESSUNG-Nr	SEX	RAUCHMENGE	BLEI [µg/g]	CADMIUM [µg/g]	ALTER	STRASSE	PARODONTIT	KERAMIK	OBST/GEM.	EINWARGE [mg]
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- = fehlender Wert
S. 34
Erläuterungen

Fortsetzung Originaldaten "Probanden"

19	0	.400	0	31	0	1	0	9.200
20	0	.300	0	37	0	2	0	7.100
21	0	.300	.020	47	0	1	0	10
22	0	0	.030	55	1	2	0	14.500
23	0	.400	0	44	0	1	0	5
24	0	.400	.030	38	0	1	0	13.600
25	20	0	0	22	0	1	0	9.800
26	0	.300	0	50	1	2	0	6.800
27	20	.400	0	27	0	1	0	13.400
28	0	0	0	19	1	2	0	9.700
29	0	.400	.040	40	0	0	0	17.900
30	20	.400	.020	23	0	0	0	7.100
31	20	.300	.030	47	0	0	0	29.800
32	20	12.600	.020	60	0	0	0	19.100
33	0	0	0	48	1	0	0	9.300
34	0	.400	.030	35	0	0	0	24.700
35	0	.300	.020	54	1	0	0	69.600
36	0	.300	.030	58	0	0	0	177
37	20	1.600	.020	38	0	0	0	85.700
38	0	.400	0	55	0	0	0	26
39	0	.300	.030	57	0	0	0	18.500
40	0	0	.020	19	0	0	0	46.500
41	0	.300	.040	53	0	1	0	15.600
42	0	.400	.030	54	0	0	0	9.300
43	30	1.400	.550	52	0	1	0	101.300
44	0	0	.020	40	1	0	0	44.800
45	0	.300	0	50	0	0	0	51
46	0	0	0	54	0	0	0	53.400
47	0	0	.030	53	1	0	0	8.300
48	0	.300	.030	48	0	0	0	82.800
49	0	.400	.020	46	0	0	0	10.500
50	0	.400	0	-	1	0	0	31.200
51	0	0	.040	53	0	0	0	8.500
52	20	.300	.030	28	1	1	0	4.900
53	20	.400	.040	50	0	0	0	29.500
54	0	.400	.020	55	1	0	0	34.200
55	0	0	0	62	0	2	0	29.400
56	20	1.400	.330	39	0	0	0	36.600
57	0	0	.040	50	1	1	0	57.300
58	0	0	.030	54	0	1	0	76.200
59	0	.300	.020	66	0	0	0	84.200
60	30	1.800	.030	38	0	1	0	29.700
61	0	.400	.020	30	1	0	0	87.300
62	20	.300	.020	23	0	0	0	10.100
63	0	.300	0	47	0	0	0	8.800
64	0	.400	.020	42	1	2	0	9.900
65	0	.300	.030	54	0	0	0	32.800
66	0	.300	.020	39	0	1	0	9.800
67	0	0	.040	42	0	2	0	41.600
68	0	.400	.030	53	1	1	0	18.500
69	0	.300	.020	57	1	0	0	12.600
70	0	.400	0	64	1	1	0	11.600
71	0	.400	.020	73	0	2	0	182.100
72	0	0	.030	65	0	0	0	20.300
73	0	0	.040	51	1	2	0	22.300
74	0	.400	.020	62	0	0	0	12.200
75	0	.400	0	79	0	0	0	57.800
76	20	.300	.020	25	0	0	0	18.200
77	30	.300	.030	46	1	0	0	55.600
78	20	5.200	.030	41	0	0	0	23.800
79	0	0	.020	54	0	0	0	15
80	20	0	.040	46	0	2	0	24

ORIGINAL-DATEN (KONTROLLE)				
GRUPPE	MESSUNG-Nr	SEX	RAUCHMENGE	BLEI CADMIUM
	1	1	0	.482 .254
	2	1	0	.468 .050
	3	1	1000	.714 .112
	4	0	0	.371 .023
	5	0	0	1.541 .041
	6	1	10	3.782 .123
	7	0	100	1.307 .063
	8	0	10	1.292 .055
	9	0	30	2.333 .038
	10	0	0	3.987 .046
	11	0	30	.488 .082
	12	1	20	6.309 .111
	13	1	0	2.542 .034
	14	1	30	3.809 .032
	15	1	10	5.494 .082
	16	1	10	2.198 .019
	17	1	20	1.099 .026
	18	0	10	.712 .052
	19	1	30	2.770 .069
	20	0	0	.468 .010
	21	0	0	1.743 .006
	22	0	30	3.418 .120
	23	1	10	4.980 .0
	24	0	0	3.511 .003
	25	0	0	1.282 .004
	26	0	0	1.531 .015
	27	0	30	.834 .025
	28	0	0	.677 .013
	29	0	0	1.277 .001
	30	1	0	.689 .031
	31	0	0	.591 .006
	32	1	30	3.093 .015
	33	1	0	2.877 .009
	34	0	0	3.156 .228
	35	1	0	2.622 .051
	36	0	10	2.934 .072
	37	0	0	4.182 .0
	38	0	0	4.156 .185
	39	1	0	1.554 .039
	40	1	0	5.452 .049
	41	1	10	6.183 .176
	42	0	0	1.780 .007
	43	0	10	4.124 .054
	44	1	0	1.787 .022
	45	0	0	1.611 .008
	46	1	10	.927 .009
	47	0	0	2.241 .001
	48	0	0	3.624 .056
	49	0	0	3.238 .003
	50	1	10	4.486 .015
	51	0	30	1.252 .012
	52	0	30	3.116 .059
	53	0	30	6.399 .072
	54	1	0	2.915 .031
	55	0	0	- .003
	56	1	0	- .013
	57	1	0	- .016
	58	1	0	- .041
	59	1	10	- .010
	60	0	10	- .011
	61	1	0	- .009
	62	1	20	- .041
	63	1	0	- .010
	64	1	0	- .015
	65	1	10	- .013
	66	1	10	- .016
	67	1	0	- .009
	68	0	20	- .046
	69	0	10	- .070
	70	0	10	- .015

Fortsetzung Originaldaten "Kontrollgruppe"

71	1	10	-	.072
72	1	10	-	.024
73	1	10	-	.015
74	1	10	-	.056
75	1	20	-	.044
76	1	20	-	.023
77	1	0	-	.098
78	1	20	-	.024
79	1	10	-	.015
80	0	0	-	.035
81	0	0	-	.411
82	0	10	-	.077
83	0	0	-	.025
84	1	20	-	.023
85	1	0	-	.024
86	1	10	-	.163
87	1	20	-	.047
88	1	10	-	.006
89	0	0	-	.003
90	0	10	-	.007
91	1	20	-	.004
92	1	10	-	.044
93	1	10	-	.007
94	0	0	-	.076
95	1	0	-	.008
96	0	20	-	.022
97	1	10	-	.025
98	1	20	-	.162
99	0	0	-	.261
100	1	10	-	.021
101	1	0	-	.010
102	1	20	-	.022
103	1	20	-	.021
104	1	0	-	.018
105	1	0	-	.015
106	1	10	-	.001
107	1	10	-	.121
108	0	10	-	.028
109	1	10	-	.004
110	0	0	-	.008
111	0	10	-	.047
112	0	10	-	.000
113	1	0	-	.012
114	0	0	-	.050
115	1	10	-	.084
116	0	0	-	.003
117	0	10	-	.190
118	0	0	-	.070
119	0	0	-	.006
120	1	0	-	.009
121	1	10	-	.011
122	0	10	-	.016
123	0	0	-	.001
124	0	0	-	.002
125	1	0	-	.003
126	0	0	-	.003
127	0	0	-	.131
128	1	0	-	.145
129	0	0	-	.013
130	1	0	-	.018
131	1	10	-	.006
132	1	10	-	.003
133	0	0	-	.060
134	1	0	-	.004
135	1	0	-	.129
136	1	0	-	.128
137	1	0	-	.003
138	1	0	-	.058
139	1	10	-	.093
140	1	10	-	.099
141	0	0	-	.163
142	1	0	-	.241
143	1	20	-	.172
144	0	20	-	.011
145	0	20	-	.343
146	0	20	-	.276
147	1	20	-	.444

Fortsetzung Originaldaten "Kontrollgruppe"

148	0	20	-	.411
149	1	20	-	.012
150	0	20	-	.035
151	1	20	-	.125
152	1	20	-	.018
153	1	20	-	.192
154	1	20	-	.104
155	1	20	-	.104
156	1	20	-	.304
157	1	20	-	.014
158	0	20	-	.057
159	1	30	-	.660
160	1	30	-	.002
161	1	30	-	.041
162	1	30	-	.055
163	1	30	-	.036
164	1	30	-	.142
165	1	30	-	.141
166	1	30	-	.533
167	1	30	-	.677
168	1	30	-	.399
169	1	30	-	.127
170	1	30	-	.162
171	1	30	-	.153
172	1	30	-	.428
173	1	30	-	.444
174	1	30	-	.170
175	1	30	-	.020
176	1	30	-	.250
177	1	30	-	.069
178	1	30	-	.028
179	1	30	-	.055
180	1	30	-	.124
181	1	30	-	.089
182	1	30	-	.087
183	1	30	-	.231
184	1	30	-	.133
185	1	30	-	0
186	1	30	-	0
187	1	30	-	0
188	1	30	-	0

8. Auswertung*)

8.1. Gesamtkollektiv Hohenpeißenberg

8.1.1. Statistik-Tabelle (mit Ausreißern)

Statistik-Tabelle für das Gesamtkollektiv ohne Untergruppen mit allen untersuchten Variablen (mit Ausreißern)

STATISTIK-TABELLE

	VARIABLE	N	Min	Max	MITTELW. ±	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f. MED von bis
1	SEX	88	0.000	1.000	.488	.503	0.000	0.000 1.000
2	RAUCHMENGE	79	0.000	30.000	7.089	10.760	0.000	0.000 0.000
3	BLEI	88	0.000	12.600	.596	1.690	.300	.300 .300
4	CADMIUM	88	0.000	.550	.033	.073	.020	.020 .030
5	ALTER	79	19.000	79.000	47.443	12.941	49.000	46.000 51.000
6	STRASSE	88	0.000	1.000	.350	.480	0.000	0.000 0.000
7	PARODONTIT	77	0.000	2.000	1.338	.771	2.000	1.000 2.000
8	KERAMIK	66	0.000	1.000	.303	.463	0.000	0.000 0.000
9	OBST./GEM.	79	0.000	1.000	.570	.498	1.000	0.000 1.000

Anm.: Zeile 1: Sex = Geschlecht; 0 = weiblich
1 = männlich

Zeile 2: Rauchmenge: Zur Eingabe in den Computer müssen die Daten in Zahlenform vorliegen. Wir verwendeten die Zahlen Null für Nichtraucher, 20 für Schwachraucher (bis 20 Zig./d) und 30 für Schwerrraucher (über 20 Zig./d).

Zeile 3: "Blei" bedeutet Bleigehalt in [µg/g]

Zeile 4: ebenso: Cadmiumgehalt in [µg/g]

Zeile 5: Alter in [Jahren]

Zeile 6: "Straße" bedeutet "Wohnen Sie an einer viel befahrenen Straße?"; 0 = nein
1 = ja

*) Die Auswertung auf den folgenden Seiten wurde auf dem Hewlett-Packard-Computer 9845 B durchgeführt.

Für seine tatkräftige Unterstützung sei an dieser Stelle Herrn Dipl.-Phys. Dr. Hamm gedankt.

Zeile 7: 0 = es liegt keine Parodontitis vor
1 = Parodontitis marg. superficialis
2 = Parodontitis marg. profunda

Zeile 8: "Keramik" bedeutet "Essen Sie aus Keramikgeschirr?"; 0 = nein
1 = ja

Zeile 9: "Obst/Gem." bedeutet "Essen Sie viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten?"; 0 = nein
1 = ja

Zu Zeile 2 "Rauchmenge" und Zeile 7 "Parodontitis": Diese Parameter in Zahlen zu fassen ist schwierig, da damit eine Wertung verbunden ist. Wählen wir die Zahlen 0, 1 und 2 für die einzelnen Parodontopathien, so ist ein anderes Ergebnis zu erwarten als bei den Zahlen 0, 5 und 7. Warum? Nun, die Zahlen 0, 1 und 2 sagen folgendes aus: Ein Nicht-Erkrankter und ein Patient mit Parodontitis marg. profunda ergeben als arithmetischen Mittelwert die Zahl 1, der gleiche Mittelwert ergibt sich bei zwei Patienten mit einer Parodontitis marg. superficialis. Somit wären bei einer statistischen Auswertung ein Nicht-Erkrankter und einer mit Parodontitis marg. profunda identisch mit zwei superfiziell Erkrankten. Bei einer Wertung mit den Zahlen 0, 5 und 7 kommt dagegen ein völlig anderes Ergebnis heraus.

Bei der Rauchmenge ergibt sich eine ähnliche Problematik.

Folglich ist bei einer statistischen Auswertung mit diesen Parametern eine besonders kritische Betrachtungsweise angezeigt, vor allem in Punkt 8.1.4. "Korrelationen". Der arithmetische Mittelwert und die Standardabweichung dieser Parameter in der obigen Statistik-Tabelle haben keine Aussagekraft, sie seien aber der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Spalte 2: N = Zahl der Observationen

Spalte 3/4: Min = die Observation mit dem geringsten Wert
Max = Maximalwert

Spalte 5: arithmetischer Mittelwert; bedeutet, daß wiederholte Messungen um ihn schwanken; wird durch Extremwerte stark beeinflusst.

Spalte 6: Standardabweichung, Maß für die Streubreite

Spalte 7: Median = der Wert, an dem die Hälfte aller Observationen darunter und die Hälfte darüber liegt; der Median wird durch Extremwerte weniger beeinflußt als der arithmetische Mittelwert; er ersetzt das arithmetische Mittel bei schiefen Verteilungen und bei Verdacht auf Ausreißer


Spalte 8/9: 95 % - Vertrauensbereich des Medians; darunter versteht man den Bereich, der einen unbekannten Median mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit überdeckt, oder anders gesagt: Wenn man sich nicht auf eine Stichprobe (in unserem Fall zB. 80) beschränkt, sondern alle Fälle untersucht, wird sich der "wahre" Median mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit in dem angegebenen Bereich befinden.

Sämtliche der oben aufgeführten Variablen wurden mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Tests auf Gauß-Verteilung überprüft. Es zeigte sich in keinem Fall eine Gauß-Verteilung.

Der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test ist ein Test, der eine gegebene Verteilung mit einer idealen Gauß-Verteilung vergleicht. Bei unserer Statistik geht der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test von einer 5-prozentigen Irrtumswahrscheinlichkeit aus, das heißt er gibt eine gegebene Verteilung als Gauß-verteilt an, wenn dies mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Fall ist.

8.1.2. Histogramm der Altersverteilung

(Gesamtkollektiv)



Anm.: Auf der Graphik erscheint hinter der Bezeichnung "GAUSS" rechts oben erst der arithmetische Mittelwert und dahinter die Standardabweichung. Darunter ist der Median abgedruckt.

Unter dem Median wird das 50 % - Fraktile angegeben. Es bezeichnet den Wert, bei dem 50 % der Säulenfläche unter diesem Wert liegt und 50 % darüber. Somit wird die Gesamtfläche in zwei flächenmäßig gleich große Stücke unterteilt.

Unter dem 50 % - Fraktile erscheint schließlich der Gleichgewichtspunkt. An diesem Punkt befindet sich die Verteilung im Gleichgewicht, das heißt würden die Säulen als Gewichte aufgefaßt, wäre die linke und rechte Seite gleich schwer.



Der Gleichgewichtspunkt und das 50 % - Fraktile hängen von der Wahl der Klassenbreite ab.

Die angegebenen vier Meßpunkte stellen ein Maß für die "zentrale Tendenz" dar, lassen also auf die Verteilung des Kollektivs schließen bzw. einen Trend feststellen. Bei idealer Gauß-Verteilung fallen die vier Punkte in einem Punkt zusammen.

Wir haben in alle Graphiken vom Computer optimale Gauß- oder exponentielle Kurven einzeichnen lassen, auch wenn die Verteilung nicht immer eindeutig gegeben war.

8.1.3. Histogramm des Blei- und Cadmiumgehalts (mit Ausreißern)

Es wurden keine Untergruppen gebildet.



8.1.4. Korrelations-Tabelle (mit Ausreißern)

KORRELATIONS - MATRIX						
	SEX	RAUCHMENGE	BLEI	CADMIUM	ALTER	STRASSE
SEX		.238461*	.042191	-.072474	-.218363	.018351
RAUCHMENGE			.283974*	.317713*	-.421176*	-.119996
BLEI				-.003753	-.045321	.142994
CADMIUM					.006399	-.130815
ALTER						-.070485
	PARODONTIT	KERAMIK	OST.GEM.			
SEX	-.095966	.263752*	-.033032			
RAUCHMENGE	-.153957	-.025963	-.093226			
BLEI	-.25756*	-.073006	-.142735			
CADMIUM	-.004852	.010992	.153208			
ALTER	.302981*	-.220831	-.106778			
STRASSE	-.110696	-.116563	-.050740			
PARODONTIT		.174453	.016399			
KERAMIK			.165760			

Bei den mit * versehenen Werten ist eine Korrelation vorhanden (95%-Int. |r| > 0)

Anm.: Angegeben ist der Korrelationskoeffizient r.
Eine Korrelation ist dann vorhanden, wenn das 95%-Vertrauensintervall von |r| den Nullpunkt nicht enthält. In der obigen Tabelle ist zwar nur der Wert r und nicht das zugehörige 95%-Vertrauensintervall abgedruckt, das Intervall wurde aber vom Computer geprüft. Nur wo ein * erscheint, ist der gesamte 95%-Bereich zur Gänze größer oder kleiner als 0, nur dann ist also eine Korrelation vorhanden. Bei negativen Werten spricht man von einer negativen Korrelation. Je größer der Wert |r| ist, desto besser ist die Korrelation. r kann nur Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen.

r ist nicht robust gegenüber Ausreißern.

Wie unter Punkt 8.1.1. angeführt, sind Korrelationen mit den Parametern "Rauchmenge" und "Parodontitiden" kritisch zu beurteilen.

In unserem Kollektiv sind folgende Korrelationen feststellbar:

1. Die Rauchmenge ist mit dem Geschlecht korreliert, Männer rauchen mehr als Frauen.
2. Mit der Rauchmenge steigt der Bleigehalt im Zahnstein an.
3. Mit der Rauchmenge steigt der Cadmiumgehalt im Zahnstein an.

4. Mit dem Alter nimmt die Rauchmenge ab. Hier liegt der höchste Korrelationskoeffizient in unserem Kollektiv vor ($r = -0,42$).
5. Das Geschlecht ist mit der Benutzung von Keramikgeschirr korreliert. Nach der Tabelle essen mehr Männer aus Keramikgeschirr als Frauen.
6. Seltsamerweise ist der Bleigehalt negativ mit der Schwere von Erkrankungen des Zahnhalteapparates korreliert. Dies bedeutet, daß Patienten ohne Parodontopathien höhere Bleiwerte aufweisen als Patienten mit einer Parodontitis marginalis superficialis und diese wiederum höhere als Patienten mit einer Parodontitis marginalis profunda.
7. Das Alter korreliert mit Parodontopathien, das heißt mit steigendem Alter nimmt die Schwere der Parodontalerkrankungen zu (1).

8.1.5. Statistik-Tabelle (ohne Ausreißer)

Es wurden von den sechs Blei-Ausreißern drei eliminiert. Die Eliminierung aller Blei-Ausreißer hätte das Bild verfälscht, beispielsweise waren alle Blei-Ausreißer Raucher. Hätten wir alle sechs Ausreißer gestrichen, wären das Kollektiv "Raucher" um ein Viertel geschrumpft.

Nach Eliminierung der drei Blei-Ausreißer 12,6 ppm, 7,5 ppm und 5,2 ppm und der drei Cadmium-Ausreißer 0,55 ppm, 0,33 ppm und 0,24 ppm ergibt sich folgende Tabelle für die Variablen Blei- und Cadmiumgehalt (die anderen Variablen bleiben unverändert):

(1): Diese Aussage ist ein "Nebentbefund" unserer Untersuchung. Genauerer findet sich im Anhang, S. 77 f.

STATISTIK-TABELLE


VARIABLE	N	Min	Max	MITTELW. ±	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f. MED von bis
BLEI	77	0.000	1.000	.291	.315	.300	.300 .300
CADMIUM	77	0.000	.040	.020	.014	.020	.020 .030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

Anm.: Auch nach Ausreißer-Eliminierung liegt keine Gauß-Verteilung vor.


8.1.6. Histogramm des Blei- und Cadmiumgehalts (ohne Ausreißer)

In dieselbe Graphik wurden eine Exponential- und eine Gaußkurve eingezeichnet.




BLEI

N = 77




CHROMIUM

N = 77



CADMIUM

N = 77



[ug/g]

8.1.7. Korrelations-Tabelle (ohne Ausreißer)

	SEX	RAUCHMENGE	BLEI	CADMIUM	ALTER	STRASSE
SEX		.239461*	.218653	-.009036	-.218363	.013351
RAUCHMENGE			.363226*	.065491	-.421176*	-.113996
BLEI				-.060142	-.123565	-.154532
CADMIUM					.077533	.012109
ALTER						-.070485
	PARODONTIT	KERAMIK	OBST/GEH.			
SEX	-.095966	.263752*	-.033032			
RAUCHMENGE	-.155957	-.025963	-.093226			
BLEI	-.185506	.152657	-.039797			
CADMIUM	.149342	-.074634	-.029772			
ALTER	-.302981*	-.220931	-.106778			
STRASSE	-.110696	-.116563	-.050740			
PARODONTIT		.174453	.016339			
KERAMIK			.165760			

Bei den mit * versehenen Werten ist eine Korrelation vorhanden (95%-Int. |r| > 0)

Gegenüber der Korrelations-Tabelle unter 8.1.4. (Gesamtkollektiv mit Ausreißern) sind folgende Veränderungen feststellbar:

1. Eine Korrelation zwischen Rauchmenge und Cadmiumgehalt ist jetzt nicht mehr gegeben.
2. Eine negative Korrelation zwischen Blei und Parodontitis liegt nicht mehr vor.

8.2. Kollektiv Hohenpeißenberg und Vergleichskollektiv

8.2.1. Statistik-Tabelle "Nichtraucher + Raucher/Probanden" und "Nichtraucher + Raucher/Kontrolle" für den Blei- und Cadmiumgehalt mit Ausreißern

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vert.r.f. MED von	bis
BLEI								
NR Prob	54	0.000	.400	.222	.177	.300	.300	.300
R Prob	25	0.000	12.600	1.428	2.893	.400	.300	.400
NR Kont	31	.371	5.452	2.091	1.328	1.743	1.307	2.622
R Kont	23	.400	6.399	3.105	1.921	3.093	2.198	3.889
CADMIUM								
NR Prob	54	0.000	.040	.019	.015	.020	.020	.030
R Prob	25	0.000	.550	.064	.126	.030	.020	.030
NR Kont	74	0.000	.411	.050	.076	.016	.012	.031
R Kont	114	0.000	.677	.097	.133	.047	.032	.069

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p).05)

8.2.2. Korrelations-Tabelle "Kontrollgruppe" und "Probanden" (mit Ausreißern)

KORRELATIONS - MATRIX (Kontrollgruppe)

	SEX	RAUCHMENGE	BLEI	CADMIUM
SEX				
RAUCHMENGE				
BLEI				

Bei den mit * versehenen Werten ist eine Korrelation vorhanden (95%-Int. |r| > 0)



KORRELATIONS - MATRIX (Probanden)



	SEX	RAUCHMENGE	BLEI	CADMIUM
SEX				
RAUCHMENGE				
BLEI				

Bei den mit * versehenen Werten ist eine Korrelation vorhanden (95%-Int. |r| > 0)

8.2.3. Histogramm "Nichtraucher/Probanden" und "Nicht-raucher/Kontrollgruppe"

für Blei und Cadmium mit Ausreißern





Um zu überprüfen, ob sich zwei miteinander zu vergleichende Kollektive unterscheiden (zum Beispiel bezüglich des Bleigehalts) oder nicht, gibt es mathematische Signifikanztests. Jeder Test hat ein eigenes Anwendungsgebiet. Beispielsweise wendet man den t-Test an, wenn bei beiden zu vergleichenden Kollektiven eine Gauß-Verteilung vorliegt und wenn die Varianzen in etwa übereinstimmen (Varianz = Standardabweichung²). Damit stellt dieser Test anspruchsvolle Voraussetzungen; er besitzt aber dafür im statistischen Sinne große Macht (zur Erinnerung: Zur Überprüfung, ob eine Gauß-Verteilung vorliegt, wird der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test benutzt). Da unsere Kollektive und Untergruppen diese strengen Voraussetzungen nicht erfüllten, wendeten wir den t-Test nicht an. Er sei hier aber er-

wähnt, weil viele Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Medizin den t-Test im Vertrauen auf seine Robustheit gegenüber Verletzungen der Voraussetzungen benutzen.

Bei unserer Auswertung wendeten wir zwei Tests an: Den Cramer- von Mises-Test und den Vier-Felder-Test. Bei diesen Tests handelt es sich um sogenannte "konservative Tests". Hier sind keine so strengen Voraussetzungen mehr gefordert, um den Test anwenden zu können.

Der Cramer- von Mises-Test verlangt eine homomere Verteilung der zwei Kollektive, das heißt es müssen in etwa gleiche Verteilungsformen vorliegen wie exponentielle oder annähernde Gauß-Verteilung. Es müssen keine ähnlichen Varianzen vorhanden sein. Unter diesen Voraussetzungen vergleicht der Cramer-von Mises-Test zwei Kollektive in ihrer "zentralen Tendenz".

Für den Vier-Felder-Test ist die Verteilungsform gleichgültig. Er vergleicht bei zwei alternativen Kollektiven, wieviele Werte unter einer bestimmten Separationsgrenze (zum Beispiel dem Gesamtmedian zweier Kollektive) liegen und wieviel darüber. Es wird dabei geprüft, inwieweit die Feldbesetzung (=Anzahl der jeweiligen Werte oberhalb bzw. unterhalb der Separationsgrenze) signifikant von der unter der Nullhypothese zu erwartenden Feldbesetzung abweicht.

Die Kollektive "Nichtraucher Probanden" und "Nichtraucher Kontrollgruppe" unterscheiden sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \cong 0,000$ für Blei (nach dem Cramer-von Mises-Test). Dies bedeutet, daß die Probanden-Nichtraucher hochsignifikant niedrigere Bleiwerte haben (1).

(1): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 62

Für Cadmium sieht das Ergebnis so aus:





1. Nimmt man den Vier-Felder-Test mit dem Gesamtmedian als Separationsgrenze, so ist kein signifikanter Unterschied feststellbar ($p \cong 0,422$).
2. Wählt man den Gesamtmittelwert als Separationsgrenze, so zeigt das Kollektiv "Probanden" hochsignifikant niedrigere Werte ($p \cong 0,002$).
3. Der Cramer-von Mises-Test (eigentlich nicht indiziert, da keine ähnlichen Verteilungen vorliegen) weist für das Kollektiv "Kontrolle" nahezu signifikant niedrigere Werte aus ($p \cong 0,054$).

Normalerweise geben die Tests, auch wenn einer davon nicht exakt indiziert ist, einen ähnlichen Trend an, für Cadmium jedoch zeigt sich, daß das Testergebnis von der Wahl der Separationsgrenze abhängt. Beim Vier-Felder-Test unter Punkt 1 ist kein Unterschied zwischen den Kollektiven nachweisbar (1), obwohl, wie aus dem Histogramm auf Seite 45 ersichtlich ist, bei den Probanden Cadmiumwerte über $0,06 \mu\text{g/g}$ nicht vorkommen, während 21 % der Cadmiumwerte der Kontrollgruppe über diesem Wert liegen.

Diese Beobachtungen legen den konservativen Schluß nahe, daß sich die beiden Kollektive hinsichtlich des Cadmiumgehalts nicht unterscheiden.

(1): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 62

8.2.4. Histogramm "Raucher/Probanden" und "Raucher/ Kontrolle" für Blei und Cadmium mit Ausreißern



Der Bleigehalt der "Probanden-Raucher" (Median 0,4 ppm Pb) liegt unter dem der "Kontroll-Raucher" (3,1 ppm Pb). Dieser Unterschied ist hochsignifikant mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \approx 0,0002$. Angewendet wurde der Vier-Felder-Test. Sowohl für "Gesamtmedian" als auch für "Gesamtmittelwert" als Separationsgrenze ergibt sich $p \approx 0,0002$ (1).

Der Cadmiumgehalt der "Probanden-Raucher" beträgt im Median 0,03 ppm Cd, derjenige der "Kontroll-Raucher" 0,05 ppm Cd. Betrachtet man die Cadmium-Verteilung der zwei Kollektive als homomer, und benutzt man den Cramer-von Mises-Test, so zeigen die "Probanden-Raucher" keine signifikant niedrigere Belastung als die "Kontroll-Raucher" ($p \approx 0,071$).

Hält man die Verteilung nicht für homomer, und wendet man den Vier-Felder-Test an (Separationsgrenze "Gesamtmedian"), so zeigen sich hochsignifikante Unterschiede mit $p \approx 0,0001$ (2).





Zu berücksichtigen ist, daß die "Kontroll-Raucher" einen höheren Anteil an Schwerrrauchern als die "Probanden-Raucher" enthalten.

Angesichts dieser Lage wird eine konservative Testentscheidung, nämlich daß sich für Cadmium keine signifikanten Unterschiede nachweisen lassen, bevorzugt.

(1): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 63

(2): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 63

8.2.5. Histogramm "Nichtraucher/Probanden" und "Raucher/Probanden"
für Blei und Cadmium mit Ausreißern




Das Kollektiv der Raucher zeigt für Blei und Cadmium geringfügig höhere Medianwerte als das Kollektiv der Nichtraucher. Der Cramer-von Mises-Test weist keine signifikanten Unterschiede aus. Allerdings spricht das Maß der "zentralen Tendenz" für höhere Blei- und Cadmiumgehalte der Raucher, und auch der Vier-Felder-Test bestätigt diese Richtung (1).

Zu beachten ist, daß unter dem Kollektiv der Raucher nur ein sehr geringer Anteil an Starkrauchern war, und von den Schwachrauchern rauchten manche nur wenige Zigaretten pro Woche. Dies kann erklären, warum keine signifikanten Unterschiede zwischen Rauchern und Nichtrauchern zu finden waren.

8.2.6. Blei-Cadmium-Korrelationsdiagramme

Für die Gruppen "Raucher/Probanden", "Raucher/Kontrolle" und "Nichtraucher/Kontrolle" zeigten sich keine Blei-Cadmium-Korrelationen.

Nur für die "Nichtraucher/Probanden" ergab sich folgende negative Korrelation:



(1): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 64

8.3. Untergruppen des Kollektivs Hohenpeißenberg

Überprüfung der Untergruppen bezüglich des Blei- und Cadmiumgehalts

Um zu überprüfen, ob ein bestimmter Personenkreis einer besonderen Belastung ausgesetzt ist, bildeten wir folgende Untergruppen (1):

- a) Nichtraucher Frauen
 Nichtraucher Männer
 (die Untergruppe Raucher Frauen/Raucher Männer hatte zu wenig Observationen, um sich zur Untersuchung zu eignen)
- b) verschiedene Altersgruppen:
 - Alter 19-38 Jahre
 - Alter 39-56 Jahre
 - Alter 57-79 Jahre
- c) Bewohner von nicht viel befahrenen Straßen
 Bewohner von viel befahrenen Straßen
- d) Patienten, die nicht aus Keramikgeschirr essen
 Patienten, die aus Keramikgeschirr essen
- e) Patienten, die nicht viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten essen
 Patienten, die viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten essen
- f) nach Parodontalerkrankungen aufgeteilt:
 - Patienten ohne Erkrankung
 - Patienten mit Parodontitis marginalis superficialis
 - Patienten mit Parodontitis marginalis profunda

Bis auf die Untergruppen b) und f) wendeten wir den Cramer-von Mises-Test an. Es zeigte keine Untergruppe eine signifikant höhere Belastung. Weibliche Nichtraucher hatten keine höhere oder niedrigere Belastung für Blei oder Cadmium als männliche Nichtraucher aufzuweisen (diese Aussage gilt auch für die Kontrollgruppe). Bei Bewohnern von viel befahrenen Straßen war kein erhöhter Schwermetallgehalt nachzuweisen. Keramikgeschirr kommt nicht als Verursacher einer Belastung in Frage und auch nicht das Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten.

(1): siehe Computer-Ausdruck im Anhang, S. 67 ff.

Diese Feststellungen gelten mit und ohne Ausreisser.

Bei b) und f) liegen mehr als zwei Untergruppen vor. In diesem Fall benutzten wir den Kruskal-Wallis-Test und anschließend den Trend-Test (Sj-Test von Jonckheere), da der Cramer-von Mises-Test nur bei zwei zu vergleichenden Gruppen indiziert ist.

Der Kruskal-Wallis-Test dient dazu, herauszufinden, ob sich bei mehr als zwei Untergruppen mindestens eine von den anderen signifikant unterscheidet. Der Trend-Test sagt aus, ob bei mehr als zwei Untergruppen für eine bestimmte Reihenfolge ein Trend besteht oder nicht.

Für die verschiedenen Altersgruppen zeigte der Kruskal-Wallis-Test keine signifikanten Unterschiede, und der Trend-Test ließ für verschiedene Reihenfolgen der Altersgruppen keinen Trend erkennen. Diese Aussagen gelten sowohl mit als auch ohne Ausreißer und beziehen sich auf den Blei- und Cadmiumgehalt.

Für die Untergruppen von Punkt f) ergab sich folgendes: Nur beim Cadmiumgehalt (Kollektiv mit Ausreißern) unterscheidet sich mindestens ein Kollektiv von allen anderen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \geq 0,045$ (Kruskal-Wallis-Test).

Laut Trend-Test bestehen diese Tendenzen:

1. Mit Ausreißern: Für Blei:

Für die Reihenfolge

- 1) Keine Erkrankung
- 2) Parodontitis marg. sup.
- 3) Parodontitis marg. prof.

ist ein Trend mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \geq 0,00002$ vorhanden (Trend= abnehmender Bleigehalt).

Für Cadmium:

Für die Reihenfolge

- 1) Parodontitis marg. sup.
- 2) Parodontitis marg. prof.
- 3) keine Erkrankung

ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \cong 0,000$ ein Trend vorhanden (Trend = abnehmender Cadmiumgehalt).

2. Ohne Ausreißer: Für Blei

Für die Reihenfolge

- 1) Parodontitis marg. sup.
- 2) Parodontitis marg. prof.
- 3) keine Erkrankung

ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \cong 0,004$ ein Trend vorhanden (Trend = zunehmender Bleigehalt).

Für Cadmium:

Für die Reihenfolge

- 1) Parodontitis marg. prof.
- 2) Parodontitis marg. sup.
- 3) keine Erkrankung

ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p \cong 0,00001$ ein Trend vorhanden (Trend = abnehmender Cadmiumgehalt).

Die genauen Daten und die Computer-Ausdrucke finden sich im Anhang, ab S. 67.

9. Literaturvergleich

Nachfolgend ein Literaturvergleich von unserer Arbeit mit früheren, aus Gründen der Übersichtlichkeit in Tabellenform. Die Untersuchungen sind chronologisch geordnet. Näheres zu den bisherigen Arbeiten kann in Kapitel 4.3. nachgelesen werden.

Jahr Gebiet	Forscher	Kollektiv	Mittelwert	s	Median	95% - Vb.	n
1977 München	Herzog	Normalpersonen männl.	5,58	6,23			75
		Normalpersonen weibl.	1,92	1,64			30
		Verkehrspolizisten	10,98	10,30			24
		Arbeiter in Akku-Fabrik	14,01	9,21			9
		Arbeiter i. chem. Fabrik	45,34	34,99			9
Land München		Arbeiter im Autobau	52,87	50,75			40
1978 München	Emslander	Nicht-Exponierte	4,37	2,12			18
		Belastete	25,1	9,7			4
1979 München	Hohmann	Pat. mit Par. m. prof.			4,95	3,5 - 7,8	51
		Pat. mit Par. m. sup.			8,90	5,5 - 20,6	46
1979 Polen	Baczyk	Buchhalter	5,65				
		berufl. Exponierte	34,23				
1982 Norddtl.	Sonnt.-Dierks	Industriearbeiter in Unter-/Oberoker	11,4	11,0	7,8	2,6 - 15,2	15
		Bew. v. Unter-/Oberoker	3,83	3,02	2,25	1,6 - 5,0	32
		Bewohner von Goslar	2,29	2,51	1,4	0,65 - 2,9	18
		Bewohner von Wolfsburg	42,20	21,98	1,5	1,4 - 1,6	41
1982 Japan	Kobayashi	Bewohner von Tokio	6,62		5,72		41
		Bew. der Region Ichikawa	20,29		8,26		17
1983 CSSR	Havlik	Landbewohner (Böhmen/Mähren)	0,26	0,526			36
		Bewohner von Prag	4,53	3,935			32
		Belastete (Bleihütte)	31,49	15,19			28
1985 Niederbayern Ohneis		Zementwerksarbeiter	3,491	3,250	2,279	1,750 - 2,947	60
		Kontrollgruppe (Land)	2,523	1,669	2,287	1,554 - 2,934	54
		davon: Raucher	3,105	1,921	3,093	2,198 - 3,889	23
		Nichtraucher	2,091	1,328	1,743	1,307 - 2,622	31
1985 Peißenberg (Oberbay.)	Langseder	Landbewohner	0,6	1,7	0,3	0,3 - 0,3	80

Ann.: s = Standardabweichung, 95% - Vb. = 95% - Vertrauensbereich, n = Zahl der Proben

Jahr Gebiet	Forscher	Kollektiv	Mittelwert	s	Median	95% - Vb.	n
1977 München	Herzog	Normalpersonen männl.	0,11	0,10			75
		Normalpersonen weibl.	0,084	0,096			30
		Verkehrspolizisten	0,49	0,43			24
		Arbeiter in Akku-Fabrik	0,04	0,07			9
		Arb. in chem. Fabrik	0,84	0,83			9
Land München		Arbeiter im Autobau	0,27	0,22			40
1982 Norddtl.	Sonnt.-Dierks	Industriearbeiter in Unter-/Oberoker	0,958	1,21	0,34	0,1 - 3,9	15
		Bew. v. Unter-/Oberoker	0,265	0,177	0,215	0,08 - 0,70	32
		Bewohner von Goslar	0,29	0,34	0,19	0,02 - 1,54	18
		Bewohner von Wolfsburg	0,26	0,17	0,18	0,15 - 0,98	41
1982 Japan	Kobayashi	Bewohner von Tokio	1,47		0,92		16
		Bew. der Region Ichikawa	7,25		2,54		47
1983 München	Uygun	Nichtraucher	0,017	0,021	0,010		43
		Schwachraucher	0,057	0,054	0,024		32
		Starkraucher	0,138	0,132	0,093		29
		Zigarrenraucher	0,192	0,189	0,130		30
1985 Niederbayern Ohneis		Zementwerksarbeiter	0,097	0,252	0,004	0,000 - 0,013	60
		Kontrollgruppe (Land)	0,050	0,057	0,033	0,022 - 0,050	50
		davon: Nichtraucher	0,042	0,063	0,022	0,009 - 0,039	31
		Raucher	0,062	0,044	0,055	0,032 - 0,072	23
1985 Peißenberg (Oberbay.)	Langseder	Landbewohner	0,033	0,073	0,020	0,020 - 0,030	80

10. Zusammenfassung

Es wurden 80 Zahnsteinproben aus dem Gebiet um den Hohenpeißenberg mit der flammenlosen Atomabsorptionsspektrometrie auf Blei- und Cadmiumgehalt untersucht.

Der Median für Blei lag bei 0,3 ppm (95%-Vertrauensbereich: 0,3 - 0,3 ppm), der Median für Cadmium bei 0,02 ppm (95%-Vb.: 0,02 - 0,03 ppm). Der arithmetische Mittelwert für Blei betrug $0,6 \pm 1,7$ ppm, für Cadmium $0,03 \pm 0,07$ ppm.

Eliminiert man Ausreißer, so ergeben sich folgende Werte: Blei: Der Median beläuft sich auf 0,3 ppm (95%-Vb.: 0,3 - 0,3 ppm), der Mittelwert auf $0,3 \pm 0,3$ ppm.

Cadmium: Median 0,02 ppm (95%-Vb.: 0,02 - 0,03 ppm), Mittelwert $0,02 \pm 0,01$ ppm.

Aus den Arbeiten von UYGUN und OHNEIS (1) bildeten wir ein Vergleichskollektiv ("Kontrolle"). Die Arbeiten von UYGUN und OHNEIS beruhen auf demselben Verfahren wie unsere Untersuchung. Die Proben des Vergleichskollektivs stammen aus München und Abensberg/Niederbayern.

Die Probanden (=Bewohner des Gebiets um den Hohenpeißenberg) zeigten einen hochsignifikant niedrigeren Blei-gehalt als das Vergleichskollektiv (2). Die Mediane:

Nichtraucher Probanden:	0,3 ppm Pb (95%-Vb.: 0,3-0,3 ppm)
Nichtraucher Kontrolle:	1,7 ppm Pb (95%-Vb.: 1,3-2,6 ppm)
Raucher Probanden:	0,4 ppm Pb (95%-Vb.: 0,3-0,4 ppm)
Raucher Kontrolle:	3,1 ppm Pb (95%-Vb.: 2,2-3,9 ppm) (3)

Beim Cadmiumgehalt läßt sich keine Aussage hinsichtlich signifikanter Unterschiede zwischen Probanden und Vergleichskollektiv machen, sowohl für Raucher als auch für Nichtraucher. Der Grund dafür liegt im ungleichen Verteilungsmuster der beiden Kollektive (4), so daß verschiede-

(1): 30 und 16

(2): Cramer-von Mises-Test, $p \geq 0,000$ für Raucher und Nicht-raucher, vgl. S. 46 und S. 49

(3): S. 43 ff.

(4): vgl. Histogramme S. 44 f., S. 48

ne Signifikanztests zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (1). Die Mediane:

Nichtraucher Probanden:	0,02 ppm Cd (95%-Vb.: 0,02-0,03 ppm)
Nichtraucher Kontrolle:	0,02 ppm Cd (95%-Vb.: 0,01-0,03 ppm)
Raucher Probanden:	0,03 ppm Cd (95%-Vb.: 0,02-0,03 ppm)
Raucher Kontrolle:	0,05 ppm Cd (95%-Vb.: 0,03-0,07 ppm) (2)

Innerhalb des Kollektivs Hohenpeißenberg bildeten wir verschiedene Untergruppen: Nichtraucher/Raucher, Frauen/Männer, verschiedene Altersgruppen, Bewohner von viel und nicht viel befahrenen Straßen, Probanden, die aus Keramikgeschirr essen, Probanden, die viel Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten essen, Patienten mit verschiedenen Parodontalerkrankungen. Es zeigte keine Untergruppe eine signifikant höhere Belastung (3).

Im Literaturvergleich sind die Bleiwerte vom Hohenpeißenberg extrem niedrig, ein geringerer Bleigehalt wurde bisher nur einmal ermittelt, die nächsthöheren Werte liegen eine Dezimale über unseren. Die Cadmiumwerte sind sehr niedrig, nur zwei Kollektive lagen unter unserem, alle anderen darüber.

Nach unserer Untersuchung ist keine Schwermetallbelastung im Gebiet um den Hohenpeißenberg zum Zeitpunkt der Probenahme erkennbar, unsere Ergebnisse deuten auf ein ländlich-unbelastetes Gebiet hin.

-
- (1): für Nichtraucher: Vier-Felder-Test mit Separationsgrenze "Gesamtmedian": $p \approx 0,422$, mit "Gesamtittelwert": $p \approx 0,002$ (d.h. hochsignifikant niedrigere Werte für "Probanden"), Cramer-von Mises-Test: $p \approx 0,054$ (in diesem Fall nahezu signifikant niedrigere Werte für das Kollektiv "Kontrolle"), vgl. dazu S. 46/47;
für Raucher: Cramer-von Mises-Test: $p \approx 0,071$ (d.h. keine signifikante Unterschiede), Vier-Felder-Test mit Separationsgrenze "Gesamtmedian": $p \approx 0,0001$ (d.h. hochsignifikante Unterschiede), vgl. dazu S. 49
- (2): S. 43 ff.
- (3): vgl. S. 52 ff.

11. Literaturverzeichnis

- 1 BUNZL, K. (GSF Neuherberg) mdl, Mitteilung Sept. 1985
- 2 DRASCH, G. mdl. Mitteilung Sept. 1985
- 3 EMSLANDER, N. Untersuchungen über den Bleigehalt
in Zahnstein, Zahnhartgeweben, Al-
veolarknochen und venösem Blut
Med Diss, München 1978
- 4 EWERS, U. Untersuchungen über den Zahnbleigehalt
BROCKHAUS, A. von Schulkindern aus 2 unterschied-
GENTER, E. lich belasteten Gebieten in Nord-
IDEL, H. westdeutschland
SCHÜRMANN, E.A. Int Arch Occup Environ Health 44: 65-80
(1979)
- 5 GRAF, E. Gadamer's Lehrbuch der chemischen
PREUSS, R. Toxikologie und Anleitung zur Aus-
mittlung der Gifte
Band I/2
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1979
- 6 HAVLIK, J. Studie o obsahu olova v zubním kameni
Cesk Stomatol 83 : 399-404 (1983)
- 7 HERZOG, J. Untersuchungen über den Blei- und
Cadmiumgehalt des menschlichen Zahnsteins
Med Diss, München 1977
- 8 HOFFMANN-AXTHELM, W. Lexikon der Zahnmedizin
Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin 1983

- 9 HOHMANN, R. Der Bleigehalt im Zahnstein bei Parodontopathien
Med Diss, München 1979
- 10 JOAS, A. Cadmium in der Humantoxikologie -
Eine Literaturübersicht
Med Diss, München 1983
- 11 KOBAYASHI, T. Trace elements in dental calculus -
lead, cadmium and zinc collected in
Tokyo and the Ichikawa area
Shikwa Gakuho 82 : 1687-97 (1982)
- 12 LANDESGEWERBEANSTALT Blei-Studie
BAYERN
Nürnberg, August 1982
- 13 NEEDLEMAN, H.L. Subclinical lead exposure in Philadelphia school children.
DAVIDSON, I. Identification by dentine lead analysis
SEWELL, E.M. N Engl J Med 290: 245-8 (1974)
SHAPIRO, I.M.
- 14 NEUKIRCH, P. Blei in der Humantoxikologie - Eine
Literaturübersicht
Med Diss, München 1982
- 15 NÜRNBERG, H.W. Deposition von Säure und toxischen
NGUYEN, V.D. Schwermetallen mit den Niederschlägen
VALENTA, P. in der Bundesrepublik Deutschland
Jahresbericht Kernforschungsanstalt
Jülich 1983
- 16 OHNEIS, M. Untersuchungen über den Blei- und
Cadmiumgehalt im Zahnstein von
Zementwerksarbeitern
Med Diss, München 1985

- 17 SANSONI, B.
KRACKE, W.
DIETL, F.
FISCHER, J.
Mikrobestimmung von Blei in verschiedenen Umweltproben durch flammenlose Atomabsorption nach externer Naßveraschung mit H_2O_2/Fe^{2+}
in: Producing of the international Symposium: "Environmental health aspects of lead"
Amsterdam Oct. 2-6 (1972)
- 18 SCHONGAUER NACHRICHTEN 22. 3. 1984
- 19 SCHONGAUER NACHRICHTEN 23. 3. 1984
- 20 SCHONGAUER NACHRICHTEN 24. 3. 1984
- 21 SCHONGAUER NACHRICHTEN 28. 3. 1984
- 22 SCHRAMMEL, P. (GSF Neuher.) mdl. Mitteilung Sept. 1985
- 23 SMITH, M.
Recent work on low level lead exposure and its impact on behavior, intelligence, and learning
J Am Acad Child Psychiatry 24 :
24-32 (1985)
- 24 SONNTAG-DIERKS, L.
Über den Blei- und Cadmiumgehalt des Zahnsteins und der Zähne bei Bewohnern im Gebiet verschiedener Blei- und Zinkhütten
Med Diss, München 1982
- 25 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 27. 3. 1984
- 26 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 28. 3. 1984

- 27 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 15. 5. 1984
- 28 UMWELTBUNDESAMT Berichte 4/77; Luftqualitätskriterien
für Cadmium
Berlin 1977
- 29 UMWELTBUNDESAMT Cadmium-Bericht
Berlin 1981
- 30 UYGUN, H. Der Cadmium-Gehalt des Zahnsteins bei
verschiedenen Rauchgewohnheiten
Med Diss, München 1983
- 31 WOLF, A. (GSF Neuherberg) mdl. Mitteilung Sept.-Okt. 1985

Nachtrag:

- 32 FRIBERG, L. Cadmium in the environment
PISCATOR, G. 2nd Edition, CRC Press, Cleveland/
NORDBERG, G. Ohio 1974
KJELLSTRÖM, I.
- 33 SCHENKEL, E. Über die Beziehungen der Bleivergiftung
zu den Zahnkrankheiten
Med Diss, Berlin 1929
- 34 SCHMIDT, J. Untersuchungen über den Bleigehalt im
Zahnstein und Speichel bei Arbeitern
des Bleigewerbes
Med Diss, Leipzig 1933
- 35 PFRIEME, F. Über den normalen und pathologischen
Bleigehalt der Zähne von Menschen und Tieren
Med Diss, Halle 1934

12. Anhang (Computer-Ausdrucke)

12.1. zu Punkt 8.2.3., S.44 ff.

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- NR PROB
Y SUBFILE -- NR KONT

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen 9.948
liefert die Testgröße T = 2.305

a-Niveau = 0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .000$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- NR PROB
Y SUBFILE -- NR KONT

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen 1.843
liefert die Testgröße T = .450

a-Niveau = 0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .054$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 4 = CADMIUM in Gruppen: NR PROB / NR KONT
SEPARATION = GESAMT-MEDIAN = .0200

		NR PROB	NR KONT	TOTAL
Anzahl CADMIUM >	.020	23	34	57
Anzahl CADMIUM <=	.020	31	40	71
TOTAL		54	74	128

ERGEBNIS : FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H_0
diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .4224
Unterschiede sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit $p = .4224$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 4 = CADMIUM in Gruppen: NR PROB / NR KONT
SEPARATION = GESAMT-MITTELWERT = .0371

		NR PROB	NR KONT	TOTAL
Anzahl CADMIUM >	.037	7	27	34
Anzahl CADMIUM <=	.037	47	47	94
TOTAL		54	74	128

ERGEBNIS : FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H_0
diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .0023
Unterschiede sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit $p = .0023$ zu sichern !

Anm.: Steht unter dem Cramer-von Mises-Test zB. das
"ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .054$ zu sichern!",
so bedeutet das: Das Kollektiv mit dem niedrigeren Median
weist eine geringere Schwermetallbelastung auf, und die
Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt 5,4 %. Hat ein Kollektiv
einen höheren Mittelwert, das andere einen höheren
Median, so gibt der Median Auskunft, welches Kollektiv
das höher und welches das geringer belastete ist.

12.2. zu Punkt 8.2.4., S. 48 ff.

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 3 = BLEI in Gruppen: R Prob / R Kont
SEPARATION = GESAMT-MEDIAN = 1.0130

		R Prob	R Kont	TOTAL
Anzahl BLEI >	1.013	6	18	24
Anzahl BLEI <=	1.013	19	5	24
TOTAL		25	23	48

ERGEBNIS : FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H0 diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .0002
Unterschiede sind mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit $p = .0002$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 3 = BLEI in Gruppen: R Prob / R Kont
SEPARATION = GESAMT-MITTELWERT = 2.2315

		R Prob	R Kont	TOTAL
Anzahl BLEI >	2.232	3	15	18
Anzahl BLEI <=	2.232	22	8	30
TOTAL		25	23	48

ERGEBNIS : FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H0 diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .0002
Unterschiede sind mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit $p = .0002$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 4 = CADMIUM in Gruppen: R Prob / R Kont
SEPARATION = GESAMT-MEDIAN = .0400

		R Prob	R Kont	TOTAL
Anzahl CADMIUM >	.040	3	63	66
Anzahl CADMIUM <=	.040	22	31	73
TOTAL		25	114	139

ERGEBNIS : FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H0 diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .0001
Unterschiede sind mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit $p = .0001$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- R Prob
Y SUBFILE -- R Kont

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen 2.738
liefert die Testgröße $T = .404$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .071$ zu sichern !

12.3. zu Punkt 8.2.5., S. 50 ff.

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- NR Prob
Y SUBFILE -- R Prob

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .260
liefert die Testgröße $T = .056$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .332$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- NR Prob
Y SUBFILE -- R Prob

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .076
liefert die Testgröße $T = .016$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .670$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 3 = BLEI in Gruppen: NR Prob / R Prob
SEPARATION = GESÄMT-MEDIAN = .3000

		NR Prob	R Prob	TOTAL
Anzahl BLEI >	.300	10	14	32
Anzahl BLEI <=	.300	36	11	47
TOTAL		54	25	79

ERGEBNIS: FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H_0 diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .0487
Unterschiede sind mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit $p = .0487$ zu sichern !

VIER-FELDER -TEST für Var.Nr. 4 = CADMIUM in Gruppen: NR Prob / R Prob
SEPARATION = GESÄMT-MEDIAN = .0200

		NR Prob	R Prob	TOTAL
Anzahl CADMIUM >	.020	23	14	37
Anzahl CADMIUM <=	.020	31	11	42
TOTAL		54	25	79

ERGEBNIS: FISHER'S exakte Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei Geltung von H_0 diese Zellenbesetzung oder eine noch extremere auftritt = .1926
Unterschiede sind mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit $p = .1926$ zu sichern !

12.4. zu Punkt 8.2.5., S. 50 ff.

("Raucher + Nichtraucher/Probanden" ohne Ausreißer)

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW. ±	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vert.f. MED von bis
<u>BLEI</u>							
NR Prob	54	0.000	.400	.222	.177	.300	.300 .300
R Prob	22	0.000	1.000	.473	.400	.350	.300 .400
<u>CADMIUM</u>							
NR Prob	54	0.000	.040	.019	.015	.020	.020 .030
R Prob	22	0.000	.040	.022	.014	.025	.020 .030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- NR Prob
Y SUBFILE -- R Prob

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .111
liefert die Testgröße T = .023

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .645 zu sichern !
TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS





VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- NR Prob
Y SUBFILE -- R Prob

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .016
liefert die Testgröße T = .003

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .723 zu sichern !







12.5. zu Punkt 8.3., S. 52 ff.





a)

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Verteil.f. MED von bis
BLEI							
NR Prob M	33	0.000	.400	.212	.178	.300	0.000 .300
NR Prob M	21	0.000	.400	.238	.177	.300	0.000 .400
NR Kont W	18	.371	4.162	2.040	1.291	1.677	1.202 3.156
NR Kont M	13	.469	5.432	2.162	1.439	1.707	1.277 2.077
CADIUM							
NR Prob M	33	0.000	.040	.020	.014	.020	.020 .030
NR Prob M	21	0.000	.040	.019	.015	.020	0.000 .030
NR Kont W	37	0.000	.411	.057	.089	.013	.007 .050
NR Kont M	37	.001	.254	.043	.062	.016	.012 .031

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)





TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
 X SUBFILE -- NR Prob W
 Y SUBFILE -- NR Prob M

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .010
 liefert die Testgröße T = .002

α -Niveau = 0.10 für T > 0.347
 0.05 für T > 0.461
 0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .727$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
 X SUBFILE -- NR Kont W
 Y SUBFILE -- NR Kont M

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .135
 liefert die Testgröße T = .038

α -Niveau = 0.10 für T > 0.347
 0.05 für T > 0.461
 0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .592$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
 X SUBFILE -- NR Prob W
 Y SUBFILE -- NR Prob M

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .007
 liefert die Testgröße T = .002

α -Niveau = 0.10 für T > 0.347
 0.05 für T > 0.461
 0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .730$ zu sichern !

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
 X SUBFILE -- NR Kont W
 Y SUBFILE -- NR Kont M

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .406
 liefert die Testgröße T = .121

α -Niveau = 0.10 für T > 0.347
 0.05 für T > 0.461
 0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .365$ zu sichern !

b) mit Ausreißern

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE	GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertn.f.MED	
						+-		von	bis
<u>BLEI</u>									
	ALTER19-38	17	0.000	7.500	.918	1.794	.400	.300	.400
	ALTER39-56	46	0.000	5.200	.333	.753	.300	.300	.300
	ALTER57-79	16	0.000	12.600	1.025	3.091	.300	.300	.400
<u>CADMIUM</u>									
	ALTER19-38	17	0.000	.330	.036	.077	.020	.020	.030
	ALTER39-56	46	0.000	.550	.039	.083	.030	.020	.030
	* ALTER57-79	16	0.000	.030	.017	.013	.020	.020	.020

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- BLEI
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER39-56
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER57-79
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER19-38
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 3.5597 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 3.55967) = .16867
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .16867 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: ALTER39-56
 2: ALTER57-79
 3: ALTER19-38
 Sj = .40631 (Normalverteilung)
 PROB (Sj) > .40631 = .31338 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .31338 ein Trend vorhanden !

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- CADMIUM
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER57-79
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER19-38
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER39-56
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 3.0176 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 3.01765) = .14825
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .14825 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: ALTER57-79
 2: ALTER19-38
 3: ALTER39-56
 Sj = .15092 (Normalverteilung)
 PROB (Sj) > .15092 = .44002 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .44002 ein Trend vorhanden !

ohne Ausreißer

VARIABLE	GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f.MED	von bis
BLEI									
	ALTER19-38	16	0.000	1.800	.366	.571	.400	.300	.400
	ALTER39-56	45	0.000	.400	.224	.173	.300	0.000	.300
	ALTER57-79	15	0.000	.400	.253	.164	.300	0.000	.300
CADMIUM									
	ALTER19-38	16	0.000	.040	.018	.013	.020	0.000	.020
	ALTER39-56	44	0.000	.040	.023	.015	.030	.020	.030
	ALTER57-79	16	0.000	.030	.017	.013	.020	.020	.020

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- BLEI
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER39-56
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER57-79
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER19-38
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 3.1021 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 3.1021) = .21202
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .21202 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: ALTER39-56
 2: ALTER57-79
 3: ALTER19-38
 Sj = .81942 (Normalverteilung)
 PROB (Sj > .81942) = .20627 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .20627 ein Trend vorhanden !

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- CADMIUM
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER19-38
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER57-79
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- ALTER39-56
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 3.3983 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 3.3983) = .18284
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .18284 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: ALTER19-38
 2: ALTER57-79
 3: ALTER39-56
 Sj = .49777 (Normalverteilung)
 PROB (Sj > .49777) = .30932 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .30932 ein Trend vorhanden !

c) mit Ausreißern

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f.NED von bis
BLEI							
STR. HEIN	52	0.000	5.200	.419	.765	.300	.300 .400
STR. JA	28	0.000	12.600	.925	2.675	.300	0.000 .400
CADMIUM							
STR. HEIN	52	0.000	.550	.040	.090	.020	.020 .030
* STR. JA	28	0.000	.040	.020	.015	.020	.020 .030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- STR. HEIN
Y SUBFILE -- STR. JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .020
liefert die Testgröße T= .005

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .717 zu sichern !
TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- STR. HEIN
Y SUBFILE -- STR. JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .008
liefert die Testgröße T= .002

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .729 zu sichern !

ohne Ausreißer

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELM. =	STD-ABW. =	MEDIAN	95%-Vert. f. MED von	bis
BLEI								
STR. HEIM	51	0.000	1.000	.325	.362	.300	.300	.300
STR. JA	26	0.000	.400	.223	.104	.300	0.000	.300
CADMIUM								
STR. HEIM	49	0.000	.040	.020	.014	.020	.020	.030
STR. JA	20	0.000	.040	.020	.015	.020	.020	.030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p=.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- STR. HEIM
Y SUBFILE -- STR. JA

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- STR. HEIM
Y SUBFILE -- STR. JA

CRAMER-VON MISES-TEST

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .010
liefert die Testgröße $T = .004$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

Die Summe der quadr. Differenzen .004
liefert die Testgröße $T = .001$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .733$ zu sichern !

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .720$ zu sichern !

d) mit Ausreißern

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELM. =	STD-ABW. =	MEDIAN	95%-Vert. f. MED von	bis
BLEI								
KER. HEIM	46	0.000	12.600	.646	1.960	.300	.300	.400
KERAMIK JA	20	0.000	1.000	.305	.449	.300	.300	.400
CADMIUM								
KER. HEIM	46	0.000	.350	.034	.079	.020	.020	.030
KERAMIK JA	20	0.000	.330	.036	.071	.020	.020	.030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p=.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- KER. HEIM
Y SUBFILE -- KERAMIK JA

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- KER. HEIM
Y SUBFILE -- KERAMIK JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .007
liefert die Testgröße $T = .001$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

Die Summe der quadr. Differenzen .013
liefert die Testgröße $T = .003$

α -Niveau = 0.10 für $T > 0.347$
0.05 für $T > 0.461$
0.01 für $T > 0.743$

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .730$ zu sichern !

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p = .725$ zu sichern !

ohne Ausreißer

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW. +-	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f.MED von bis	
<u>BLEI</u>								
KER. NEIN	44	0.000	1.600	.270	.267	.300	.300	.300
KER. JA	20	0.000	1.800	.305	.449	.300	.300	.400
<u>CADMIUM</u>								
KER. NEIN	45	0.000	.040	.022	.013	.020	.020	.030
KER. JA	19	0.000	.040	.020	.015	.020	0.000	.030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, $p > .05$)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- KER. NEIN
Y SUBFILE -- KERAMIK JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .014
liefert die Testgröße T= .003

α -Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .724$ zu sichern !
TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- KER. NEIN
Y SUBFILE -- KERAMIK JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr.Differenzen .013
liefert die Testgröße T= .003

α -Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit $p \geq .725$ zu sichern !

e) mit Ausreißern

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELM. ±	STD-ABW. ±	MEDIAN	95%-Verteilung von bis
BLEI							
O/GEM MEIN	34	0.000	12.600	.002	2.426	.350	.300 .400
OB/GEM. JA	45	0.000	5.200	.393	.005	.300	.300 .300
CADMIUM							
O/GEM MEIN	34	0.000	.040	.021	.015	.025	.020 .030
OB/GEM. JA	45	0.000	.550	.043	.096	.020	.020 .030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- O/GEM MEIN
Y SUBFILE -- OB/GEM. JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .046
liefert die Testgröße T= .011

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- O/GEM MEIN
Y SUBFILE -- OB/GEM. JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .014
liefert die Testgröße T= .003

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .690 zu sichern ! ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .723 zu sichern !

ohne Ausreißer

STATISTIK-TABELLE

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELM. ±	STD-ABW. ±	MEDIAN	95%-Verteilung von bis
BLEI							
O/GEM MEIN	32	0.000	1.600	.309	.207	.300	.300 .400
OB/GEM. JA	44	0.000	1.000	.204	.330	.300	.300 .300
CADMIUM							
O/GEM MEIN	34	0.000	.040	.021	.015	.025	.020 .030
OB/GEM. JA	42	0.000	.040	.020	.014	.020	.020 .020

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
X SUBFILE -- O/GEM MEIN
Y SUBFILE -- OB/GEM JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .032
liefert die Testgröße T= .008

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

TWO INDEPENDENT SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
X SUBFILE -- O/GEM MEIN
Y SUBFILE -- OB/GEM JA

CRAMER-VON MISES-TEST

Die Summe der quadr. Differenzen .009
liefert die Testgröße T= .002

a-Niveau =0.10 für T > 0.347
0.05 für T > 0.461
0.01 für T > 0.743

ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .704 zu sichern ! ERGEBNIS: Unterschiede sind mit p>= .727 zu sichern

f) mit Ausreißern

VARIABLE	GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vert.f. MED
					±		von	bis
BLEI								
	KEINE ERKR	14	0.000	12.600	1.743	3.600	.400	.400
	PAR.M.SUP.	23	0.000	1.800	.370	.425	.300	.400
	PAR.M.PROF	40	0.000	5.200	.355	.804	.300	.300
CADMIUM								
	KEINE ERKR	14	0.000	.030	.014	.013	.020	.020
	PAR.M.SUP.	23	0.000	.550	.060	.125	.030	.040
	PAR.M.PROF	40	0.000	.240	.026	.037	.020	.030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p>.05)

MULTIPLE SAMPLE TESTS

VARIABLE -- BLEI
 1. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- KEINE ERKR
 2. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- PAR.M.SUP.
 3. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- PAR.M.PROF

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 2.9551 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 2.95506) = .22020
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .22020 unterscheidet sich
 mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: KEINE ERKR
 2: PAR.M.SUP.
 3: PAR.M.PROF
 Sj = 4.05967 (Normalverteilung)
 PROB (Sj > 4.05967) = .00002 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit
 von p= .00002 ein Trend vorhanden !

MULTIPLE SAMPLE TESTS

VARIABLE -- CADMIUM
 1. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- PAR.M.SUP.
 2. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- PAR.M.PROF
 3. Gruppe sei Subfile-Nr. =
 SUBFILE -- KEINE ERKR

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 6.2092 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 6.20917) = .04484
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p= .04484 unterscheidet sich
 mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

REIHENFOLGE:
 1: PAR.M.SUP.
 2: PAR.M.PROF
 3: KEINE ERKR
 Sj = 4.53471 (Normalverteilung)
 PROB (Sj > 4.53471) = .00000 (einseitig)
 ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit
 von p= .00000 ein Trend vorhanden !

ohne Ausreißer

VARIABLE GRUPPE	N	Min	Max	MITTELW.	STD-ABW.	MEDIAN	95%-Vertr.f.MED von	bis
BLEI								
KEINE ERKR	12	0.000	1.600	.350	.434	.400	0.000	.400
PAR.M.SUP.	23	0.000	1.000	.370	.425	.300	.300	.400
PAR.M.PROF	39	0.000	.400	.231	.170	.300	.300	.300
CADMIUM								
KEINE ERKR	14	0.000	.030	.014	.013	.020	0.000	.020
PAR.M.SUP.	21	0.000	.040	.023	.016	.030	0.000	.030
PAR.M.PROF	39	0.000	.040	.021	.014	.020	.020	.030

Ein * bedeutet: GAUSS-Verteilung ! (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungs-Test, p=.05)

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- BLEI
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- PAR.M.SUP.
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- PAR.M.PROF
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- KEINE ERKR
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 1.7900 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 1.79078) = .40045
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .40045 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :

```
REIHENFOLGE:
1: PAR.M.SUP.
2: PAR.M.PROF
3: KEINE ERKR
Sj = 2.69011 (Normalverteilung)
PROB (Sj > 2.69011) = .00357 (einseitig)
ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .00357 ein Trend vorhanden !
```

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE -- CADMIUM
1 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- PAR.M.SUP.
2 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- PAR.M.PROF
3 .Gruppe sei Subfile-Nr. =
SUBFILE -- KEINE ERKR
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

CHI-SQUARE = 4.7033 DF = 1
 PROB (CHI-SQUARE > 4.70332) = .09521
 ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .09521 unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen!

TREND-TEST (Sj-TEST von JONCKHEERE) :


```
REIHENFOLGE:
1: PAR.M.PROF
2: PAR.M.SUP.
3: KEINE ERKR
Sj = 4.30058 (Normalverteilung)
PROB (Sj > 4.30058) = .00001 (einseitig)
ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p>= .00001 ein Trend vorhanden !
```

12.6. zu Punkt 8.1.4., 7., S. 40

Altersabhängigkeit der Parodontopathien

Wie aus der Korrelations-Tabelle, S. 39, ersichtlich ist, findet sich eine Korrelation zwischen Lebensalter und Schweregrad der Parodontopathien.

Wir bildeten die drei Untergruppen "keine Erkrankung", "Par. marg. sup." und "Par. marg. prof." und betrachteten deren Altersverteilung. Das Histogramm hatte folgendes Aussehen:



Es liegen drei Untergruppen vor, daher kommen Kruskal-Wallis-Test und Trend-Test zur Anwendung.

Im obigen Histogramm unterscheidet sich mindestens eine Gruppe von allen anderen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p = 0,060$.

Für die Reihenfolge

- 1) keine Erkrankung (Mittelwert: 41,5 J., Median: 40,5 J.)
- 2) Par. marg. sup. (Mittelwert: 44,0 J., Median: 47,0 J.)
- 3) Par. marg. prof. (Mittelwert: 50,8 J., Median: 50,0 J.)

besteht ein Trend mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $p = 0,017$, das heißt es besteht statistische Signifikanz.

Damit wird die Aussage von S. 40 bestätigt, daß mit dem Lebensalter parodontale Erkrankungen zunehmen (vgl. Korrelationsdiagramm unten).

MULTIPLE SAMPLE TESTS

```
VARIABLE --      ALTER
SUBFILE  --      KEINE ERKR
SUBFILE  --      PAR.M.SUP.
SUBFILE  --      PAR.M.PROF
```

KRUSKAL-WALLIS TEST

```
CHI-SQUARE = 5.6366      DF = 1
PROB (CHI-SQUARE > 5.6366) = .05971
ERGEBNIS: Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von  $p = .05971$  unterscheidet sich
          mindestens eine Gruppe von allen anderen!
```

TREND-TEST (S)-TEST von JONCKHEERE :


```
REIHENFOLGE:
1:  KEINE ERKR
2:  PAR.M.SUP.
3:  PAR.M.PROF
Sj = 2.12310      (Normalverteilung)
PROB (Sj) > 2.12310 = .01687      (einseitig)
ERGEBNIS: Für obige Reihenfolge ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit
          von  $p = .01687$  ein Trend vorhanden !
```

```
Lineares Modell : Y = A + Bx
A = .47116      95% : -.17646 < A < 1.11879
B = .01624      95% : .00495 < B < .03153

Lin. Korrelationskoeffizient r
r = .30298      95% : .07938 < r < .49755
```

Quelle	Df	SS	MS	F
Regression	1	4.110	4.110	7.480
Residual	74	40.666	.550	
Total	75	44.776		

Korrelationsdiagramm:



Lebenslauf

Name: Michael Alexander Langseder

geboren: am 12. März 1962 in München

Eltern: Dr. Alois Langseder, Bankdirektor
Christiane Langseder, geb. Hönig, Hausfrau

Geschwister: ein älterer Bruder

Schule: 1968 - 1972 Grundschule an der Haldenberger
Straße in München
1972 - 1981 Rupprecht-Gymnasium München
Juni 1981 Abitur

Studium: 1981 - 1983 vier Semester an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg
seit Nov. 1983 an der Ludwigs-Maximilians-
Universität München

Prüfungen: Okt. 1982 Naturwissenschaftliche Vorprüfung
Apr. 1984 Zahnärztliche Vorprüfung
Feb. 1987 Zahnärztliche Prüfung

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is a summary of the work done and the results obtained.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments. It is a detailed account of the work done in each department and the results obtained.

3. The third part of the report deals with the work done in the various sections. It is a detailed account of the work done in each section and the results obtained.

4. The fourth part of the report deals with the work done in the various divisions. It is a detailed account of the work done in each division and the results obtained.

5. The fifth part of the report deals with the work done in the various branches. It is a detailed account of the work done in each branch and the results obtained.

6. The sixth part of the report deals with the work done in the various departments. It is a detailed account of the work done in each department and the results obtained.

7. The seventh part of the report deals with the work done in the various sections. It is a detailed account of the work done in each section and the results obtained.

8. The eighth part of the report deals with the work done in the various divisions. It is a detailed account of the work done in each division and the results obtained.

9. The ninth part of the report deals with the work done in the various branches. It is a detailed account of the work done in each branch and the results obtained.

10. The tenth part of the report deals with the work done in the various departments. It is a detailed account of the work done in each department and the results obtained.



